黃葵

編號：TARI-01

中文名稱：黃葵
中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Abelmoschus moschatus* Medic.
植物特徵：一年生或二年生草本，高1-2m。被粗毛。葉互生；葉柄長7-15cm，疏被硬毛；托葉線形，長 7-8mm；葉通常掌狀 5-7深裂，直徑6-15cm，裂片披針形至三角形， 邊緣具不規則鋸齒，偶有淺裂似槭葉狀， 基部心形，兩面均疏被硬毛。 花單生於葉腋間，花梗長2-3cm，被倒硬毛，小苞片8-10，線形，長10-13mm；花萼佛焰苞狀，長2-3cm，5裂，常早落；花黃色，內面基部暗紫色，直徑7-12cm；雄蕊柱長約2.5cm，平滑無毛，花柱分枝5，柱頭盤狀。蒴果長圓形，長56cm，先端尖，被白色長硬毛。種子腎形，具腺狀脈紋，具麝香味。花期4-10月。
生長習性：常生於平原、山谷、溪澗旁或山坡灌叢中，常有栽培。
利用部位：全株。
主要成分：黃葵葉含β-谷甾醇(β-sitosterol)，β-谷甾醇-β-D-葡萄糖甘β-sitosterol-β-D-glucoside)。花含β-谷甾醇，楊梅樹皮素(myricetin)，楊梅樹皮素-葡萄糖甘(myricetinglucoside)。乾果殼含β-谷甾醇。種子含α-腦磷脂(α-cephalin)，磷脂醯絲氨酸(phosphatidylserine)，磷脂醯絲氨酸縮醛磷脂(phosphatidylserine plasmalogen)和膽鹼縮醛磷脂(phosphatidylcholine plasmalogen)。 黃葵還含菜油甾醇(campesterol)，谷甾醇(siosterol)，豆甾醇(stigmasterol)，膽固醇 (cholesterol)及麥角甾醇(ergosterol)。
藥　　效：清熱解毒，排膿生肌止痛，下乳通便。
資料來源：http://www.hulu.com.tw/

磨盤草

編號：TARI-02

中文名稱：磨盤草
中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Abutilon indicum* (L.)Sweet
植物特徵：一年生或多年生直立的亞灌木狀草本，高1-2.5m。分枝多，全株均被灰色短柔毛。葉互生；葉柄長 2-4cm，被灰色短柔毛和絲狀長柔毛；托葉鑽形，外彎；葉卵圓形或近圓形，長 3-9cm，寬2.5-7cm，先端短尖或漸尖，基部心形，兩面均被星狀柔毛； 邊緣具不規則鋸齒。花單生於葉腋，花梗長達4cm，近頂端具節，被灰色星狀柔毛；花萼盤狀，綠色，直徑6-10mm，密被灰色柔毛，裂片5，寬卵形，先端短尖；花黃色，直徑2-2.5cm。花瓣5，長7-8mm；雄蕊柱被星狀硬毛；心皮15-20，成輪狀，花柱5，柱頭頭狀。果爲倒圓形似磨盤，直徑約1.5cm，黑色，分果判15-20。先端截形，具短芒，被星狀長硬毛。種子腎形，被星狀疏柔毛。花期春-秋月，果期夏-秋月。
生長習性：生長於村旁、曠野雜草叢中。
利用部位：全草。
主要成分：黃酮甘、酚類、氨基酸、有機酸、醣類等。
藥　　效：味甘、性平，疏風清熱、益氣通竅、祛痰利尿。
資料來源：常見中草藥(2)

紅穗鐵莧

編號：TARI-03

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceaae
學　　名：*Acalypha hispida*
植物特徵：常綠灌木。株高50-20cm。幼枝葉被竭色絨毛。葉互生，柄長5-10cm，被白色絨毛。葉片卵形、廣卵形或倒卵狀披針形，長12-20cm，寬6-16cm，基部圓形或心臟形，先端短尖或漸尖形，鈍鋸齒緣。花果期週年。
生長習性：印度、緬甸、馬來西亞原產。我國南部栽培。
利用部位：根莖、葉及穗。
主要成分：全草含鐵莧菜鹼(acalyphine)、沒食子酸，並顯黃酮、酚類的反應。
藥　　效：根及樹皮有祛痰之效。治氣喘。葉有收斂之效。花穗有清熱利濕，涼血止血之效。治腸炎，痢疾，疳積。外用治火燙傷，肢體潰瘍。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(4)

三葉五加

編號：TARI-04

中文名稱：三葉五加
中文科名：五加科
英文科名：Araliaceae
學　　名：*Acanthopanax trifoliatus*
植物特徵：多年生常綠攀緣性灌木，全株有刺，葉互生，三出複葉，繖形花序，頂生，果實球形，成熟時黑色，果期秋至冬季間。
生長習性：臺灣全境平野、山麓至中海拔山地自生。
利用部位：全草。
主要成分：含異貝殼杉烯酸（kaurenoic acid）、紫丁香甘、異秦皮定甘（isofraxedinoside）、β-穀甾醇、棕櫚酸、亞油酸、維生素B1等。
藥　　效：清熱解毒、祛風利濕、舒筋活血等功效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

洋耆草

編號：TARI-05

中文科名：菊科

英文科名：Compositae

學　　名：*Achillea millefolium* Linn.

植物特徵：多年生草本。莖直立，葉片長橢圓形至長橢圓狀披針形，頭狀花序組合成繖形狀。每頭狀花周圍具4-6 枚舌狀花，中間爲管狀花筒狀。蒴果扁形具翼。

生長習性：臺灣近年有零星藥用試驗栽培或觀賞種植。

利用部位：全草。

主要成分：揮發油、1-檸檬烯、生物鹼、穀固醇、豆固醇。

藥　　效：全草有清熱解毒、發汗驅風、和血調經、健胃整腸之效。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

紫莖牛膝

編號：TARI-06

中文科名：莧科

英文科名：Amaranthaceae

學　　名：*Achyranthes aspera* Linn. var. *rubrofusaca* Hooker f.

植物特徵：多年生草本，莖方形，節膨大，呈紫色或深綠色，葉對生，橢圓形或矩圓狀倒卵形，穗狀花序頂生或腋生，花多數，退化雄蕊變爲睫毛狀，瘦果長橢圓形，有微柔毛。

生長習性：臺灣全境荒野至低海拔山區草叢中、疏林內或陰涼路旁。

利用部位：根或全草。

主要成分：脫皮固酮、紅莧固酮、甜菜鹼、倒扣草鹼。

藥　　效：活血、舒筋、調經、益肝腎、明目、強精、利尿。

資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(5)

土牛膝

編號：TARI-07

中文科名：莧科
英文科名：Amaranthaceae
學　　名：*Achyranthes aspera*
植物特徵：多年生草本，株高60-120cm。根圓柱形，分枝，莖四稜角，常帶暗紫色，結部膝狀膨大。 葉對生， 柄長0.5-3cm，葉片卵形、橢圓形或橢圓狀披針形，長4.5 -12cm，寬1-5cm，基部微鈍形或楔形，全緣兩面被柔毛。穗狀花序頂生或腋生，開花時更伸長，花被5枚，綠色。胞果長圓形，黃褐色。種子長圓形。花期6-9月，果期9-11月。
生長習性：分布台灣中北部荒野至低海拔山區之草叢中或路旁。
利用部位：根部、種子。
主要成分：含triterpenoid saponins、大量鉀鹽、ecdysterone、inokosterone等成分。
藥　　效：生用散瘀血、消癰腫之效。熟用補肝腎，強筋骨之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

石菖蒲

編號：TARI-08

中文科名：天南星科
英文科名：Araceae
學　　名：*Acorus tatarinowii* Schott
植物特徵：多年生草本。全株 有香氣，根莖橫，多分枝，密生環節，截上多鬚根。 葉密集互生，箭狀條形，基部抱莖，全緣，脈平行．花莖，扁三稜形， 佛焰苞葉片，肉穗花序，狹圓柱形， 花密生，淡黃綠色，兩性。漿果倒卵形，帶紅色，花期4-7月，果期8月。
生長習性：生於山谷、山澗、溪旁的岩石縫中。
利用部位：根莖。
主要成分：根莖含揮發油、β-細辛醚、黃樟油素、丁香酚：L-烯丙基-2，4，5-三甲氧基苯、甲基丁香油酚、α-細辛醚等。
藥　　效：根莖味辛、性微溫。有開竅、豁痰、理氣活血、散風去濕的功能。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(下)

大本薄荷

編號：TARI-09

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Agastache rugosa* (Fisch. Et Mey.) O. Kuntze
植物特徵：多年生草本。有香味。莖直立，四稜形，葉對生，葉片心狀卵形至橢圓狀卵形。基部截形或淺心型，邊緣有鈍齒，下面有短柔毛和透明腺體。輪繖花序集成頂生圓筒狀的假穗狀花序。小堅果倒卵形，褐色。花期6-7月，果期10-11月。

生長習性：草坡或路旁，現多栽培。
利用部位：全草及葉。
主要成分：含揮發油，主要成分爲甲基胡椒酚(methyl chavicol)、檸檬烯、α和β-蒎烯、對繖花烴(pcymene)、芳樟醇、辛酮-3(3-cotonone)辛醇-3(3-octanol)、辛烯-1-醇-3(1-octen-3-ol)等，及倍半帖化合物：1-丁香烯(1-caryophyllene)、β-葎草烯、γ-畢澄茄烯(γ-cardinene)、β-欖香烯(β-elemene)、agastachoside、金合歡素(acacetin)、tilianin、蒙花甘(linarin)。
藥　　效：有祛暑解表、化濕和中、理氣開胃的功能。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(下)

白緣龍舌蘭

編號：TARI-10

中文科名：龍舌蘭科
英文科名：Agavaceae
學　　名：*Agave angustifolia* Haw
植物特徵：灌木狀多年生草本。高約1.2-2公尺，莖極短，葉叢生於莖端，呈放射狀排列，長披針形，長約0.6-1.5公尺，寬8-12公分，多肉質，蒼綠色；葉基肥大，先端漸尖，頂端具一鋼硬尖刺，葉緣平滑無刺或僅具有極微小的刺。花莖高大粗壯，長達4-7公尺，上部分枝，形成大型的穗狀花序；花朵直立，綠色或黃綠色，雄蕊6枚，藥丁字著生，子房3室。極少結實。

生長習性：海邊綠化定砂多年生木質化草本。
主要成分：植物纖維材料，以纖維素爲主要構成成分。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑

樹蘭

編號 ：TARI-11

中文科名：楝科
英文科名：Meliaceae
學　　名：*Aglaia odorata*
植物特徵：常綠灌木至小喬木。花期7-11月。果期9-1月。原產中國南部，多見於庭園、公園栽培。
生長習性：東南亞亦有分布及栽培。
利用部位：根、枝葉及花朵。
主要成分：葉含三帖成分樹蘭醇。
藥　　效：解熱、治咳嗽。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉

台灣木通

編號 ：TARI-12

中文科名：木通科
英文科名：Lardizabalaceae
學　　名：*Akebia longeracemosa* Matsum
植物特徵：落葉木質藤本。三出複葉，小葉卵圓形、寬卵圓形或長卵形，先端鈍圓、微凹或具短尖，邊緣淺裂或波狀；葉柄長6-8cm。花序總狀，腋生，長約8cm；花單性；雄花生於上部，雄蕊6；雌花花被片紫紅色，具6個退化雄蕊，心皮分離，3-12。果實肉質，長卵形，成熟後沿腹縫線開裂。種子多數，卵形，黑色。花期4-5月，果熟期8月。
生長習性：多生於山坡灌叢中或疏林內。
利用部位：木質莖。
主要成分：皂甘物質
藥　　效：舒肝理氣、活血止痛、安神利尿。
資料來源：實用中草藥彩色圖集第二冊

細香蔥

編號：TARI-13

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Allium ascalonicum* L.
植物特徵：多年生草本，簇生。根堅韌，鱗莖不明顯，外包皮膜。葉基生，線狀，中空而細，長15-60厘米。花葶自葉叢抽出，花期6月。
生長習性：台灣全境皆有生長。
利用部位：全草。
主要成分：含巴豆醛、甲基丙烯二硫化物、γ-谷氨醯肽等。
藥　　效：通氣發汗、除寒解表、治風寒感冒頭痛。外敷寒濕、紅腫、痛風、瘡瘍。
資料來源：中藥大辭典(上)

蕗蕎

編號：TARI-14

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Allium bakeri* Regel
植物特徵：多年生宿根性草本。鱗莖卵狀披針形，葉束生，斜上或彎伏，線形，花序繖形狀球形，花紫色。
生長習性：平地、山麓。
利用部位：鱗莖去鬚根及葉。
主要成分：鱗莖含大蒜糖。
藥　　效：理氣、寬胸、健胃、整腸、通陽、散結之效。
出　　處：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

韭菜

編號 ：TARI-15

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Allium tuberosum* Rottl.ex K.Spreng.
植物特徵：多年生宿根性植物，葉單片直立長綠，莖埋於土中而白色，分蘗多。
生長習性：全國各地普遍栽培。
利用部位：葉、花苔和種子。
主要成分：有維生素C、維生素B1、維生素B2、尼克酸、胡蘿蔔素、碳水化合物、硫化物及礦物質。
藥　　效：有溫中行氣、散血解毒、保暖、健胃整腸的功效；韭菜子有固精、助陽、補腎、治帶暖腰膝的功能。
資料來源：中草藥彩色圖譜

山韭菜

編號 ：TARI-16

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Allium bulleyanum* Diels
植物特徵：多年生草本。鱗莖圓柱形，具纖維狀鱗毛，葉根生。狹線形，全緣。繖狀花序頂生，花紫黑色。
生長習性：山洞、荒坡草叢中。
利用部位：全草。
主要成分：全草含硫化合物，甘類，苦味質。種子含生物鹼，皂甘。
藥　　效：散瘀止痛、作菜食可健脾養血，強筋壯骨。
資料來源：中藥大辭典（上）

蘆薈

編號：TARI-17

中文科名：百合科

英文科名：Liliaceaae

學　　名：*Aloe barbadensis* Miller var. *chinensin* Berger

植物特徵：多年生肉質常綠草本。莖短，葉叢生，呈蓮座狀。葉片肥厚，多肉汁，披針形，總狀花序呈穗狀，頂生，疏生小苞片。花多數，具短梗，彎垂，黃紅色帶深紅色斑點。花丁字著生。蒴果三角形，花期秋冬間。

生長習性：全境普遍栽培。

利用部位：根、葉。

主要成分：主含蒽酮(anthrone)配糖體、內含大黃素(barbaloin)、異蘆薈大黃素 (isonbarbaloin)、蘆薈 A、B (aloinosideA，B) 、homonataloin。

藥　　效：根治小兒疳基、尿路感染。葉有瀉火、止血、去淤、通經、殺蟲、解毒之效。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

月桃

編號：TARI-18

中文科名：薑科

英文科名：Zingiberaceae

學　　名：*Alpinia speciosa* (wendl.) K. Schum

植物特徵：草本，高2-3公尺。單葉，互生，具短葉柄，葉舌2裂，長0.8-1公分，外被棕色毛；葉片長50-70公分，寬8-15公分，披針形，兩端漸尖形，葉緣被毛，下表面中肋被毛。花序爲圓錐花序，長25-30公分，花序軸被毛，花梗長1-2公分，通常具2朵花，無苞片；小苞片長約2.5公分，2裂，乳白色，頂端呈粉紅色；花萼長約1.5公分，筒狀，一邊分裂，齒緣；花冠3片，長約2.5公分，背裂片破其他裂片大，粉紅色至白色，邊緣被毛，唇瓣長約3公分，寬約2.5公分，卵形，黃色，自基部至近緣具紅色條紋；花藥頂生，長0.8-1公分，退化雄蕊2枚，長0.6-0.8公分，線形，位雄蕊基部，紅色；花柱長約2.2公分，極纖細；子房球形，被棕色毛。果實(蒴果)具稜、球形，深紅色；頂具宿萼，不規則開裂。種子多數，黑色，具白色膜質假種皮。花期自2月至11月。

生長習性：全台低海拔山區皆有分佈。

利用部位：全草、種子、根。

主要成分：種子爲健胃芳香劑，含精油0.96%。

藥　　效：風寒頭痛、虛冷腹瀉、四肢冷痛不能屈伸，月經疼痛，筋骨酸痛。

滿天星

編號：TARI-19

中文科名：莧科
英文科名：Amaranthaceae
學　　名：*Alternanathera sessilis* (L.) DC
植物特徵：一年生草本，高10-45cm。莖上升或匍匐，多分枝，具縱溝，溝內有柔毛，在節處有1行橫生柔毛。單葉對生，無柄；葉片條狀披針形或倒卵狀矩圓形，長1-8cm，寬0.2-2cm，先端鈍尖，基部漸窄，全緣或具不顯明鋸齒。夏秋開白色花，頭狀花序1-4個腋生，球形或矩圓形，無總梗；苞片、小苞片和花被片白色，宿存；雄蕊3個，花絲基部合生成環狀，花藥1室，退化雄蕊三角狀鑽形，全緣；子房1室，有胚珠1枚。胞果倒心形，邊緣常具翅，包於花被內。
生長習性：生於曠野路邊、水邊、田邊潮濕處。
利用部位：全草。
藥　　效：清熱涼血止血，利水消腫，外用拔毒止癢。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(1)

蜀葵

編號：TARI-20

中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Althaea rosea* (L.) Cavan
植物特徵：多年生草本。莖直立而高。葉互生，心臟形。花呈總狀花序頂生，單瓣或重瓣，有紫。粉、紅、白等色；花期6-8月。蒴果，種子扁圓，腎臟形。
生長習性：耐寒，喜陽，耐半陰，忌澇。
利用部位：花、果。
主要成分：根含大量黏質、pentosans、methyl pentosans、uronic acid、galactan、rhamnosan等成分。果含脂肪油、油酸等成分。
藥　　效：花治月經過多、鼻衄不止；果治小便不通、腹泄等症。種子可榨油。
資料來源：中藥大辭典(下)

山葡萄

編號：TARI-21

中文科名：葡萄科
英文科名：Vitaceae(Ampalidaceae)
學　　名：*Ampelopsis brevipedunculata* var. hancei (Planch.) Li
植物特徵：山葡萄屬多年生落葉性藤本，卷鬚2分叉，葉心形，或偶作3淺裂，互生，鋸齒緣，葉表光滑無毛；聚繖花序與葉對生，花甚小，長度在3公厘左右，淡綠色，花瓣 5片，脫落性，雄蕊5枚，漿果球形，有毒，初呈綠白而帶紅紫，再則變成碧藍色表面密佈斑點。
生長習性：台灣全省平野及山麓叢林內。
利用部位：根、果。
主要成分：蛋白質、脂肪、碳水化合物、葡萄糖、果糖、蔗糖及鐵、鈣、磷、鉀、硼、胡蘆蔔素、 維生素B1 、維生素、 B2 、煙酸、維生素C、草酸、酒石酸、草酸、檸檬酸、蘋果酸等。
藥　　效：根之煎汁，爲民間藥劑，用以洗療眼疾；果則有毒，可治腫毒及惡瘡。
資料來源：http://duanwei.org.tw/

穿心連

編號：TARI-22

中文科名：爵床科
英文科名：Acanthaceae
學　　名：*Andrographis paniculata* (Burm.f.) Nees.
植物特徵：一年生或多年生草本，植株高30-100cm，莖直立，方形具稜，節部稍腫大，葉對生，基部楔形，總狀花序疏散呈圓錐花序，花冠白色或淡紫白色，種子多數，花果期夏秋間。
生長習性：產於亞熱帶地方。
利用部位：地上部或全株。
主要成分：含糖類、鞣質、酚類物質、生物鹼、andrographin、panicolin、panicolide、andragraphan、andrographon、andrographosterin。
藥　　效：有清熱解毒、涼血止血、消腫止痛、治急性菌痢、胃腸炎。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

知母

編號：TARI-23

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Anemarrhena asphodeloides* Bunge
植物特徵：多年生草本，根莖橫走，肥厚，具殘留纖維狀殘葉基，黃褐色，下部生多數肉質鬚根。黃褐色，下部生多數肉質鬚根。
生長習性：生於山坡，乾燥丘陵地或草原。
利用部位：根莖。
主要成分：timosaponin
(A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6)。
藥　　效：用於熱病煩渴、消渴、肺熱咳嗽、午後潮熱、夢遺、胎動不安。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

白芷

編號：TARI-24

中文科名：繖形科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Angilica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. F. var. *formosana* (boiss,) Shan et Yuan.
植物特徵：多年生草本，主根粗大直生，中空，通常呈紫紅色，葉三回羽狀分裂，最終裂片卵形至長卵形，尖端瑞尖，複繖形花序，頂生或腋生，花萼缺如，花瓣5，白色，雙懸果，扁平，橢圓形或近圓形，側棱成翅狀。
生長習性：生於林下、林緣、溪旁、灌叢及山谷草地。
利用部位：根部。

主要成分：香豆素、imperatorin、isoimperatorin、byak-angelicin、oxypeucedunin
藥　　效：1.抗菌作用 2.擴張冠狀動脈血管的作用 3.光敏作用
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈下〉

魚針草

編號：TARI-25

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Anisomeles indica*
植物特徵：爲一年生或越年生草本植物，莖多分枝，葉對生，葉卵形，輪繖花序，花萼淺綠色，花冠粉紅色或淡紫色，花期夏至秋之間，果期冬季，果實爲圓形小堅果，成熟時黑褐色。
生長習性：臺灣全境平野、山區。
利用部位：全草。
主要成分：全草含生物鹼，黃酮類，酚類。還原糖，鞣質等。
藥　　效：解熱、祛風、除濕、止痛。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

大風子

編號：TARI-26

中文科名：大風子科
英文科名：Flacourtiaceae
學　　名：*Hydnocarpus anthelmintica*
植物特徵：常綠小喬木，聚生果，斜卵形。
生長習性：西印度，熱帶各地。
利用部位：果實。
主要成分：具有大風子油。
藥　　效：治痲瘋病。

羅馬洋甘菊

編號：TARI-27

中文科名：菊科
英文科名：compositae
學　　名：*Anthemis nobilis*
植物特徵：羅馬甘菊原產於西歐北部、北愛爾蘭，常見於路邊或潮濕的牧草地。叢生矮性，株高約 10-30cm，爲耐寒性強之多年生草本植物，植株匍伏生長，二或三回羽狀細裂葉，葉片輪生，花白色或黃色。
生長習性：多年生草本植物。
利用部位：花、葉。
主要成分：精油主要含isobutyl angelate 3-39%及其他衍生物。
藥　　效：生長快速，爲良好秋冬季地被植物。花、葉具有蘋果香味，花朵曬乾後可製成花茶。其他尚具精油提取及醫療用途。
資料來源：香藥草植物圖鑑

白木香(沉香)

編號：TARI-28

中文科名：瑞香科
英文科名：Thymelaeaceae
學　　名：*Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg
植物特徵：常綠喬木，高達21cm，有香氣，樹皮灰褐色，幼枝被柔毛，葉互生，革質，葉柄短，繖形花序頂生或腋生，花梗長 0.5-1.2cm，被灰白色絨毛，花黃綠色，蒴果木質，扁倒卵形，下垂，長2.5-3 cm，密被灰毛，花被宿存，種子基部有長於種子2倍的角狀附屬體，紅棕色，花期4-5月，果期7-8月。
生長習性：生於平地，丘陵地疏林黃壤土或荒山中也少量栽培。
利用部位：含有樹脂的木材。
主要成分：agarpiric acid, agarospiral, agarospirol,白木醇。
藥　　效：鎭痛作用。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈下〉

羅比親王海棗

編號：TARI-29

中文科名：棕櫚科
英文科名：Palmaceae
學　　名：*Phoenix humilis* Royle
植物特徵：單幹，細直，高3-4公尺，幹面灰白，羽狀複葉，小葉細線狀披針形。肉穗花序，黃白色。漿果球形，熟果肉色黃至黑褐色。
生長習性：全省普遍栽培。

樹杞

編號：TARI-30

中文科名：紫金牛科
英文科名：Myrsinaceae
學　　名：*Ardisia sieboldii Miq.*
植物特徵：常綠小喬木。樹幹上部多分枝，幼枝葉及花序被褐色鱗片物。花期春、夏間。果期夏、秋間。
生長習性：分布於福建、浙江等南部地區，日本南部、琉球、小笠原島。
利用部位：根、粗莖枝及葉。
主要成分：莖葉含稜果紫金牛酚等。
藥　　效：清熱、解毒消腫、散瘀、止痛之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈5〉

春不老

編號：TARI-31

中文科名：紫金牛科

英文科名：Myrsinaceae

學　　名：*Ardisia squamulosa* Presl.

植物特徵：常綠小灌木、小喬木，全株平滑。單葉，互生，葉肉質，具葉柄，葉形爲倒卵形或倒披針形，葉緣爲全緣，葉上表面深綠色，光滑，下表面淺綠色。繖形花序，近頂生或腋生，花序軸愈著生枝條下部者愈長，花序爲下垂狀，花枝基部膨大或具關節，花萼圓形，被腺點及緣毛，花冠淡紅色至白色， 5裂，裂片闊卵形，被腺點，雄蕊5枚，子房1室，花期3月至5月。扁球形漿果，成熟時由紅色至紫黑色，平滑，具極小的線點。

生長習性：庭園植栽及綠籬。

利用部位：根、莖、果實。

藥　　效：根及莖有行血袪風、消炎消腫，果實有收斂作用，葉治痢疾、皮膚炎。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(4)

檳榔

編號：TARI-32

中文科名：棕櫚科

英文科名：Palmaceae

學　　名：*Areca catechu* L.

植物特徵：常綠喬木植物。單幹百立圓筒形，高可達15-20公尺。羽狀複葉　，簇生幹頂，呈長補圓形。花呈肉穗花序自葉鞘下部抽出，單性，雌雄同株。雄托青白色具有香氣。果實卵狀楕圓形，未成熟之嫩果外果皮呈綠色，成熟後轉爲黃或橙黃色。中果皮白色，富纖維質，內果皮爲核，內藏仁肉及水分。

生長習性：原產熱帶亞洲之馬來西亞及菲律賓。

利用部位：種子及果皮。

主要成分：檳榔素、檳榔鹼和多酚類。

藥　　效：具有殺蟲及消積作用。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈下〉

山棕

編號：TARI-33

中文名稱：山棕
中文科名：棕櫚科
英文科名：Palmae
學　　名：*Arenga engleri* Becc.
植物特徵：常綠喬木，高達10m以上。莖桿粗狀，不分枝，殘留的褐色纖維狀老葉鞘層層包被於莖桿上，脫落後呈環狀的節。葉簇生於莖頂，向外展開，葉柄堅硬。肉穗花絮自莖頂葉腋內生出，花小，雌雄異株。花期4-5月，果期10-11月。
生長習性：栽培或野生，生於村邊、庭園、丘陵山地。
利用部位：種子、葉鞘纖維。
主要成分：種子含多酚類，主要爲無色花青素和兒茶類化合物。
藥　　效：用於子宮出血、帶下、吐血、便血、崩漏、痢疾、腹瀉、腸炎等症。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑（下）

馬兜鈴

編號：TARI-34

中文科名：馬兜鈴科
英文科名：Aristolochiaceae
學　　名：*Aristolochia debilis Sieb*. et Zucc.
植物特徵：多年生纏繞或匍匐狀細弱草本。葉互生，葉柄較細，長約1-1.5厘米；葉片三角狀狹卵形，長3-8厘米，寬1.8-4.5厘米，中部以上漸狹，先端鈍圓或微凹，基部心臟形，兩前圓耳形，老時質稍厚，基出脈5-7條，較明顯。花較大，單生於葉腋間，花梗細，長1-1.5厘米；花被暗紫色，長3-5厘米，內被細柔毛，有5條縱脈直達花被頂端；雄蕊6；子房下位，長柱形，花柱6，肉質短厚，愈合成柱體，柱頭短。蒴果近圓形或矩圓形，長4-5厘米，直徑3-4厘米。
生長習性：生於山坡叢林中。
利用部位：果實。
主要成分：馬兜鈴種子含馬兜鈴酸(Aristolochic acid)和一種季鹽的生物鹼。根中含季銨鹽生物鹼木蘭花鹼(Magnoflorine)。
藥　　效：清肺降氣、化痰止咳、治肺熱咳喘、咯血、失音、痔瘻腫痛。
資料來源：中草藥彩色圖譜

貓鬚草

編號：TARI-35

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Clerodendranthus spicatus* (Thunb.) C. Y. Wu
植物特徵：多年生草本，莖直立，四方形。葉對生，一般爲卵形，葉邊緣在中部以上具齒。輪繖花序，4雄蕊與花柱均長長地伸出花冠外，形似貓鬚。卵形小堅果長約2毫米。
生長習性：多爲栽培。
利用部位：全草。
主要成分：全草含檸檬烯、borneol、thymol、葡萄糖、果糖、戊糖、尿糖、脂肪油、酒石酸、檸檬酸、葡萄糖醛酸、甘醇酸、甘醇酸、甘油酸等。
藥　　效：葉具殺蟲效果、成熟果實可供食用、根部爲民間常用之發汗劑。
資料來源：常見中草藥(2)

洋艾

編號：TARI-36

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Artemisia vulgaris*
植物特徵：爲速生的多年生植物，具辛辣氣味，葉深裂，被細毛。頂端花黃色，小而圓，銀灰色葉片。
生長習性：山坡、草原、林緣及灌叢中。
利用部位：全株。
主要成分：全草中含有東莨素等、根中含有揮發油。
藥　　效：葉和花頭浸出液助消化、益肝膽、補血、清熱和消炎藥劑。植株用於治療發燒、驅蟲、降低鉛毒。
資料來源：藥用植物圖鑑

艾草

編號：TARI-37

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Artemisia Vulgaris* L. var. *indica* Maxim.
植物特徵：有芳香氣味的多年生植物；葉中度綠色，葉背銀色，有絨毛；小花紅棕色。
利用部位：葉。
藥　　效：歐洲和亞洲都是重要草藥，葉片用於填料，摻入東方的米糕中，並捲成錐形用於熱灸。可助消化、調月經。孕期通常禁用，但中國有時用於治療胎兒過動或產後腹痛。
資料來源：藥用植物圖鑑

大力子

編號：TARI-38

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Artium lappa* Linn.
植物特徵：為二年生草本，具粗大肉質直根；莖直立，粗壯，高1-2m被乳突狀短毛和雜以蛛絲狀毛及黃色腺點。葉互生，紙質，寬卵形，頂端鈍圓，基部心形，邊緣具細尖齒、背面被灰白色絨毛，生於莖下部的長40-50mm，寬30-40mm，具長達32mm的柄，生於上部的較小，葉柄亦短；花夏季開，紫色，同型，全為兩性管狀花；花冠長約1.4mm，簷部5裂；花柱枝線形，外彎。瘦果倒卵形，長5-7mm。冠毛短，基部聯合成環，易脫落。
生長習性：生長性良好。分布於台灣各區。
利用部位：利用果皮及子葉。
藥　　效：疏散風熱、宣肺透疹、解毒利咽。
資料來源：實用中草藥彩色圖集(1)

波羅蜜

編號：TARI-39

中文科名：桑科
英文科名：Moraceae
學　　名：*Artocarpus heterophyllus* Lam.

植物特徵：常綠喬木，高8-15m。全株有乳汁。有時有板狀根。單葉，螺旋狀排列；葉柄長1-3cm；托葉佛焰苞狀，早落；葉片厚革質，倒卵狀橢圓形或倒卵形，長7-25cm，寬3-12cm，先端鈍而短漸尖，基部楔形稍下延，全緣或3裂(萌生枝或幼枝上葉)，上面深綠色，光亮，下面淺綠色，略粗糙。花單性，雌雄異株；雄花序頂生或腋生，圓柱形，長5-cm，直徑2.5 cm，幼時包藏於托葉內；雄花花被2裂，裂片鈍，雄蕊1；雌花序圓柱形或長圓形，生於樹幹或主枝上的球形花托內；雌花花被管狀，六稜形，花柱側生。聚合果長圓形、橢圓形或倒卵形，成熟時長25-60cm，寬25-50cm，大者重達20kg，黃綠色，表面有六角形的瘤狀突起，內有很多黃色肉質的花被，果柄粗壯，長5-10cm；瘦果長圓形，長約3cm，寬1.5-2cm。花期春、夏季，果期夏、秋季。
生長習性：台灣中南部零星栽培供食用與觀賞。
利用部位：葉、樹液、果實、種子。
主要成分：果實含乙酸橙黃胡椒醯胺脂(aurantiamide acetate)，環木菠蘿烯酮(cycloartenone)，多糖，有機酸和鉀(K)，鈉(Na)，鈣(Ca)，鎂(Mg)，鐵(Fe)，鋅(Zn)等金屬元素，還含有糖類15.38%～26.30%，維生素(vitmin)C，胡蘿蔔素等。
藥　　效：生津除煩，解酒醒脾。瘡癤焮赤腫痛，濕疹。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

天門冬

編號：TARI-40

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr

植物特徵：多年生蔓生草本，莖堅硬而有木質化現象，地下有紡錘狀之塊根；春季萌生新葉，葉片細鱗片狀；自葉腋處生出扁平之葉狀枝1-3枚，葉狀枝綠色、尖銳而略彎曲，可代替葉片行營養功能；花期春至夏季，小花白色，1-4朵開於葉腋，花被6枚，雄蕊6枚；漿果球形，灰白或粉紅色，內含種子1粒。
生長習性：生長於海拔1750米以下的山谷或山坡疏林或灌叢中。
利用部位：塊根。
藥　　效：用於虛勞發熱、肺燥咳嗽、吐血、傷津口渴、腸燥便秘等。
資料來源：實用中草藥彩色圖集（1）

白朮

編號：TARI-41

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Atractylodes macrocephala* Koidz.
植物特徵：多年生草本。根莖粗大，略呈拳狀。莖直立，基部木質化。單葉互生；葉片橢圓形或卵狀披針形。頭狀花序頂生，花冠管狀。瘦果長圓狀橢圓形微扁，被黃白色絨毛。
生長習性：原生於山區丘陵地帶，野生種在原產地幾以絕跡。
利用部位：乾燥的根、莖。
主要成分：含揮發油、Atractylol、Atractylon、維生素A。
藥　　效：利尿作用、降低血糖作用、抗血凝作用、強壯作用。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

小金絲竹

編號：TARI-42

中文科名：禾本科
英文科名：Gramineae
學　　名：*Bambusa vulgaris* var. striata.
植物特徵：莖根叢生，稈澄黃色而間有深綠粗細條紋，籜（竹皮）具有黃色和綠色相間的縱條，外被密毛，籜頂葉片闊三角形。
生長習性：生性強，排水良好，表土肥厚之沙質土壤。

菊花木

編號：TARI-43

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Bauhinia championi* Benth.
植物特徵：常綠木質大藤本。莖粗達20cm，橫斷面呈菊花紋。幼枝密生鏽黃色皮孔，嫩枝、葉背、花序均被短絨毛，卷鬚對生或單生。葉互生，柄長20-40mm，葉片稍革質，卵圓形，距圓形，心臟形或長橢圓形，長5-10cm，寬3-6cm，基部圓形或微凹，先端2歧裂或淺叉裂，全緣。
生長習性：臺灣全境山麓至低海山區叢林或森林內。
利用部位：根或莖及種子。
主要成分：根含黃酮類。
藥　　效：根有祛風濕、行血氣、壯筋骨、去瘀、止痛之效。子有理氣止痛、活血散瘀之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

射干

編號：TARI-44

中文科名：鳶尾科
英文科名：Iridaceae
學　　名：*Belamcanda chinensis* (L.) DC.
植物特徵：多年生宿根草本。根莖橫走，節狀，內部鮮黃色，鬚根多數。莖直立。葉著生，互生，扁平；總花序頂生，排成繖房狀；蒴果橢圓形或倒卵形。
生長習性：生長於山坡、草地、林緣、溝邊或栽培。
利用部位：根莖。
主要成分：根莖含belamcandin、iridin、tectoridin、tectorigenin。葉、花含mangiferin。
藥　　效：對皮膚癬菌有抑制作用。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

咸豐草

編號：TARI-45

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Bidens pilosa* L.var.*radiata* S.Bipontinus
植物特徵：頭狀花序呈繖形狀排列，頂生或腋生，具長梗，總苞綠色，基部有細毛，舌狀花白色4-7枚，管狀花兩性，黃色五裂。雄蕊五枚，雌蕊一枚，柱頭兩分歧。全株無毛，莖綠色直立爲方形分枝多，節處常帶淺紫色，株高約30-100公分。葉對生，有柄長約3公分，三出複葉或五葉，小葉卵形或卵橢圓形，先端銳尖或漸尖。
生長習性：郊野、公園草地或荒廢地常見的野花。
利用部位：全草。
主要成分：全草含植物固醇。
藥　　效：全草有疏表清熱、解毒、利尿、散瘀之效，治盲腸炎、肝病、糖尿病、咽喉腫毒、腸炎、子宮炎、感冒。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

扁柏

編號：TARI-46

中文科名：柏科
英文科名：Cupressaceae
學　　名：*Biota orientalis* (L.) Endl.
植物特徵：常綠喬木。樹冠圓錐形，多分枝，皮紅褐色，鱗片狀剝落。小枝羽狀排列，扁平。葉十字對生，如小鱗片狀，緊貼小枝著生，鮮綠色，先端尖，背面凹陷處具腺體 1枚。花期4-5月。果期8-10月。
生長習性：原產中國大陸北部、東北、西北及西南部。全國各地均有栽培。
利用部位：根及根皮、幹皮、枝葉。
主要成分：木材主含揮發油。
藥　　效：根白皮有長毛髮，主火灼爛之效。治熱油灼傷，火燙傷。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(4)

茄冬

編號：TARI-47

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Bischofia javanica* Blume
植物特徵：常綠大喬木，生活力、抗病力強，又名「重陽木」。老樹幹具有瘤狀突起，樹皮赤褐色，有片屑狀剝落。葉互生，具長柄，爲三出複葉，小葉橢圓形至長橢圓形葉端尖，葉緣有鈍鋸齒。雌雄異株。圓錐花序腋生，花期1-3月，花很小，黃綠色無花瓣；雌花序分枝稀疏，雄花序密集成圓錐形。5月至翌年3月結果，漿果球形，熟褐色，味甜可食，鳥類喜食；漿果可用鹽或糖醃漬，亦可釀酒。幹枝粗大，枝條開展，樹冠圓蓋形。
生長習性：作庭園樹及行道樹。
利用部位：樹皮、枝葉。
主要成分：β-香樹脂醇、熊果酸、β-穀固醇。
藥　　效：活血、補血、滋腎、利尿。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑

賽山藍(土夏枯草)

編號：TARI-48

中文科名：爵床科
英文科名：Acanthaceae
學　　名：*Blechum pyramidatum* (Lam.) Urban.
植物特徵：多年生草本。
生長習性：低海拔山地及海邊。

山苧麻

編號：TARI-49

中文科名：蕁麻科
英文科名：Urticaceae
學　　名：*Boehmeria frutescens* Thunb.
植物特徵：草本狀灌木。初期常由基部分枝，開花期則復由分枝側生小枝。枝表面灰褐色，幼枝灰白色，具縱淺溝紋。葉互生，基部圓形，先端尾漸尖，粗銳鋸齒緣，表面綠色，具痂鱗，背面灰白色，被白色絨毛，脈上具纖毛。
生長習性：全境平野至中海拔山區之山谷坡地、溪旁、河岸多見。
利用部位：根部。
主要成分：全草含二氫黃酮、克洛皂甘酸、醣類等。根含有大黃素甲醚葡萄甘及微量的大黃素。
藥　　效：根有清血止止血，散瘀消腫，解熱利尿，平肝安胎之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(4)

苧麻

編號：TARI-50

中文科名：蕁麻科
英文科名：Urticaceae
學　　名：*Boehmeria nivea* L.
植物特徵：多年生草本，莖直立，單葉互生，闊卵形或卵形。花單性，花成小束，爲 腋生的圓錐花序。瘦果細小，橢圓形，集合成小球狀。
生長習性：野生於山坡、山溝、路旁等處。
利用部位：根、葉、莖皮、花。
主要成分：根含酚類、甾醇、綠原酸。
藥　　效：清煩熱、利小便、散瘀、止血。
資料來源：中藥大辭典(上)

多花油柑

編號：TARI-51

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceaae
學　　名：*Phyllanthus reticulatus Poir*
植物特徵：灌木，高1–3m，葉片革質，卵形或寬卵形，長3–6cm，寬2–3.5cm，兩端鈍或急尖，全緣。
生長習性：生於山坡疏林下或路旁灌木叢中。
利用部位：根、葉。
藥　　效：用於痢疾、腸炎、肝炎等。

番茉莉

編號：TARI-52

中文科名：茄科
英文科名：Solanaceae
學　　名：*Brunfelsia hopesns* (Hook.) Benth
植物特徵：常綠灌木。多分枝，小枝短，葉互生，具短柄，葉片略革質，長橢圓形或倒卵形，花初開時藍色，漸變白色或淡白色，花期春、秋間。
利用部位：根或全草。
主要成分：含番茉莉鹼、紫夜香花鹼。
藥　　效：解熱、發汗、利尿、消腫、解毒。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(4)

落地生根

編號：TARI-53

中文科名：景天科
英文科名：Crassulaceae
學　　名：*Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Kurz
植物特徵：多年生肉質草本。高50-100cm，莖直立，有節，基部稍木質化，灰褐色，上部帶紫紅色，密被橢圓形皮孔。葉對生，帶紫色，基部半抱莖單葉或羽狀複葉，小葉橢圓形，兩面光滑無毛。聚繖花序，頂生或腋生，兩性花，下垂，如掛燈籠，蓇葖果，花期春天。
生長習性：台灣全境零星栽培，或平野、山地歸化成野生狀態。
利用部位：根、葉。
主要成分：檸檬酸、異檸檬酸、延胡索酸、維生素C、黃耆甘、穀固醇。
藥　　效：止血、消炎、止痛、消腫、生肌、解毒之效。治吐血、創傷出血、胃痛、關節痛、中耳炎。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

北柴胡

編號：TARI-54

中文科名：繖形科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Bupleurum chinensis* DC.
植物特徵：多年生草本，主根較粗，堅硬，黑褐色，葉互生，先端突尖，繖形花序多分枝，花序頂生兼腋生，花期7-9月，果期9-10月。
生長習性：生於乾旱荒山坡，林緣灌叢中。
利用部位：根部。
主要成分：柴胡皂甘、adonitol及少量揮發油。
藥　　效：解退熱，疏肝解鬱，升提中氣的功能，子宮脫垂，月經不調。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈下〉

高氏柴胡

編號：TARI-55

中文科名：繖形科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Bupleurum kaoi* Liu Chao et Chuang
植物特徵：多年生草木，高110-135cm，分蘖數4-9，全株光滑無毛，根直立，根頭直徑2.7cm，根重約達9.5g，最大葉長約15cm，寬約1cm。花黃色，小花梗長1-3 cm，果實橢圓形，長約2-3cm，直徑1-1.5mm，花期5-9月，果期8-11月。
生長習性：分布於台灣北部及中部。
利用部位：根。
主要成分：含saikosaponin、sterol、fatty oil、flavonoid及sugar等成分。
藥　　效：有解表退熱、疏肝解鬱、升舉陽氣的功能。

蓮實藤(白老葉刺)

編號：TARI-56

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Caesalpinia globulorum* Bahk. f. & Van Koyen
植物特徵：藥效：治風濕疼痛、牙痛、胸腹氣脹，跌打損傷等症。
生長習性：低海拔山地及海邊。
主要成分：生物鹼、黃物醇鹼E、還朝鮮黃楊鹼B。
藥　　效：治風濕疼痛、牙痛、胸腹氣脹，跌打損傷等症。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(下)

樹豆

編號：TARI-57

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Cajanus cajan* (Linn.) Millsp.
植物特徵：灌木，高1-3m，全株被灰白色絨毛。葉互生，3出複葉，小葉長橢圓狀披針形，長3-10cm，寬1-3cm，基部漸狹形，先端漸尖，全緣。春、夏間花果期。
生長習性：原產熱帶亞洲，現台灣各地零星栽培，已成歸化種。
利用部位：全株。
主要成分：種子主要含澱粉、蛋白質。
藥　　效：清熱解毒，補中益氣，利水消食，止血止痢。治心虛、水腫、血淋、痣血、腳氣、痢疾、癰疽腫毒。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

含笑花

編號：TARI-58

中文科名：木蘭科
英文科名：Magnoliaceae
學　　名：*Michelia fuscata* Bl
植物特徵：常綠灌小喬木高2-5m，葉卵狀披針波狀緣。
生長習性：平野、山麓叢林內多見。
利用部位：根及幹。

白粗糠

編號：TARI-59

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Callicarpa formosana* Rolfe
植物特徵：常綠性灌木，小枝，葉及花序均密被星狀毛茸，葉對生，卵形至長橢圓形，鋸齒緣，花小型，排列成腋生的聚繖花序，花序柄並作二叉分歧，花萼四淺裂，花冠管狀，粉紅或紫紅，雄蕊四枚，伸出花外，長度約爲花冠的三倍，子房爲不完全的兩室，果實爲漿質核果，球形，徑約2-3公厘，成熟時紫色　。
生長習性：台灣分佈全島各地平野及低海拔山地。
利用部位：樹皮、果實。
藥　　效：補腎清血，治老年人手腳酸軟無力，也能治白帶、風濕、神經痛、喉痛及眼疾等。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

尖尾鳳

編號：TARI-60

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Callicarpa longissima* (Hemsl.) Merr.
植物特徵：落葉灌木至小喬木，嫩節上有柔毛成環狀，單葉對生，披針形至卵狀披針形，聚繖花序近頂腋生，花冠紫紅色，小核果白色，球形。
生長習性：生於荒坡、溝邊、灌木叢中半陰的地方。
利用部位：根。
藥　　效：袪風散寒，活血消毒。
資料來源：中藥大辭典(上)

山茶樹

編號：TARI-61

中文科名：山茶科
英文科名：Theaceae
學　　名：*Camellia japonica*
植物特徵：常灌木或小喬木。喜半陰、忌烈日。一年有2次枝梢抽生，第一次爲春梢，於3-月開始夏梢7-9月抽生。花期長，多數品種1-2個月，單朵花期一般爲7-15天。花期2-3月。
生長習性：喜溫暖氣候，空氣濕度大，忌乾燥，宜在年降水量1200mm以上的地區生長。喜肥沃、疏鬆的微酸性土壤。
利用部位：花、種子、葉、根。
主要成分：根含有鞣質、蛋白質；葉含醣類、鞣質和苦味質；花含糖蜜和氨基酸等。
藥　　效：祛風散寒，活血消毒
資料來源：中藥大辭典(上)

喜樹

編號：TARI-62

中文科名：喜樹科
英文科名：Nyssaceae
學　　名：*Camptotheca acuminata* Dcne.
植物特徵：灌葉喬木，高達25m。樹皮灰棕色，枝有皮孔。葉互生、紙質，葉橢圓狀卵形，花瓣5，淡綠色，瘦果線形或披針形，有翅。
生長習性：生於疏林中或栽培於路邊、庭園。
利用部位：果實。
主要成分：果實含喜樹鹼、喜樹甘、紫丁香酸、多種鞣花酸；全株含喜樹鹼。
藥　　效：有抗癌、散結、破血化瘀的功能。用於各種腫瘤，如胃癌、腸癌、慢性粒細胞白血病、絨毛膜上皮癌、淋巴肉瘤。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑（下）

刀 豆

編號：TARI-63

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.
植物特徵：直或半直立性草本，高約60-100公分，全株近於平滑，三出複葉，無毛，無托葉.葉柄比小葉短;小葉卵狀長橢圓形至卵形，頂端銳形：葉緣全緣。花紫色，長2.5-3公分，花簇生於葉腋，總狀花序下垂性，花萼長約1.5公分，雄蕊10枚，分成兩體。莢果闊線形，扁平，稍彎曲，長約30公分，種子10-15顆，種皮白色。嫩莢扁平如刀片狀，故名之，種子腎形，白或紅色。
生長習性：臺灣地區原由美國引進作爲綠肥作物.過去於平地、山園栽培普遍.今日已漸稀少。
利用部位：種子。
主要成分：含刀豆球朊（canavaline）、刀豆胍氨酸等。
藥　　效：用於虛寒呃逆、嘔吐。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

紅花美人蕉

編號：TARI-64

中文科名：美人蕉科
英文科名：Cannaceae
學　　名：*Canna indica* L.
植物特徵：多年生直立草本、全株綠色無毛，高達1.5m。根狀莖塊狀。葉互生：葉片長大，長方橢圓形，長10-30cm，寬8-15cm，先端短漸尖，基部楔形至圓形，全緣，側脈羽狀傘形顯著。全年開紅色花，總狀花序頂生，常被蠟質白粉，每花具1片長約1.2cm的卵形苞片；萼片3，披針形，淡綠色；花冠管狀，3裂，綠色或紅色；雄蕊5個，花瓣狀鮮紅色，黃色、乳黃色，雜色；其中一個具花藥，最外3個爲退化雄蕊，倒披針形，較花冠更大，另有一個特大，反卷爲唇瓣，全緣。蒴果綠色，長卵形，有軟刺，長1.2-1.8cm。
生長習性：全國各地普遍栽植；亦有野生於濕潤草地。
利用部位：根狀莖、花。
主要成分：根莖含澱粉、脂肪、生物鹼、樹膠。
藥　　效：根：黃疸型急性傳染性肝炎，神經官能症，高血壓病，紅崩，白帶；外用治跌打損傷，瘡瘍腫毒。
花：治外傷出血。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (2)

美人蕉(黃花)

編號：TARI-65

中文科名：美人蕉科
英文科名：Cannaceae
學　　名：*Canna indica* L.
植物特徵：多年生直立草本、全株綠色無毛，高達1.5m。根狀莖塊狀。葉互生；葉片長大，長方橢圓形，長10–30cm，寬8–15cm，先端短漸尖，基部楔形至圓形，全緣，側脈羽狀傘形顯著。全年開紅色或黃色大花，總狀花序頂生，常被蠟質白粉，每花具1片長約1.2cm的卵形苞片；萼片3，披針形，淡綠色；花冠管狀，3裂，綠色或紅色；雄蕊5個，花瓣鮮紅色，黃色、乳黃色；其中一個具花藥，最外3個爲退化雄蕊，倒披針形，較花冠更大，另有一個特大，反卷爲唇瓣，全緣。蒴果綠色，長卵形，有軟刺，長1.2–1.8cm。
生長習性：全國各地普遍栽植；亦有野生於濕潤草地。
利用部位：根狀莖及花。
主要成分：根莖含澱粉、脂肪、生物鹼、樹膠。
藥　　效：具有清毒利濕、安神鎮定、活血去瘀的功用。主要用於治療咽喉痛、扁桃腺炎、淋巴結核、肝病、高血壓、腎虛等。花可治療外傷，並有美容功用。根莖兼治閃腰扭傷、燙傷、煩躁不安、癰疔、婦女諸症、血熱血崩、赤白帶下、筋骨軟弱、肺炎。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑（下）

辣椒

編號：TARI-66

中文科名：茄科
英文科名：Solanaceae
學　　名：*Capsicum frutescens* L.
植物特徵：一年生草本，葉互生葉片卵狀披針形，基部漸狹，延入葉柄，葉柄長，花白色，花柱線狀，朔果紅色或橙黃色，種子多數，扁圓形。
利用部位：果實。
主要成分：辣椒鹼、二氫辣椒鹼、降二氫辣椒鹼、高辣椒鹼、高二氫辣椒鹼、辣椒紅素、微量辣椒紅玉素、胡蘿蔔素。
藥　　效：溫中、散寒、開胃、消食。
資料來源：中藥大辭典(下)

紅花

編號：TARI-67

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Carthamus tinctorius* L.
植物特徵：一年生草本，莖、枝堅硬，無毛。葉互生，革質。頭狀花序爲具針刺的苞葉所圍繞，於莖、枝之頂複作繖房花序式排列；總苞卵形，花夏季開，桔紅色，全爲兩性管狀花。瘦果倒卵形，乳白色。
生長習性：大陸各省均有栽培。
利用部位：花。
主要成分：含carthamin、neo-carthamin、acarthamone、紅花素、saffor yellow。
藥　　效：用於閉經痛經、瘀血作痛、心絞痛、冠心痛、跌打損傷。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

九層塔

編號：TARI-68

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Caryopteris incana* (Thunb.) Miquel
植物特徵：多年生灌木狀草本，全株密被短絨毛，葉對生，具短柄，葉片卵形或卵狀矩圓形至卵狀披針形。聚繖花序，成對生葉腋，層層如塔狀，多數具柄之花束。蒴果球形，外被粗毛，4個果瓣，瓣圓內彎如翅，抱住種子。花期5-10月。
生長習性：中南部丘陵、山麓曠野多見。
利用部位：全草。
主要成分：全草含黃酮類、生物鹼、酚類、固體、氨基酸、有機酸、鞣質。
藥　　效：有祛風、散淤、除濕、止咳、解毒之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

叢立孔雀椰子

編號：TARI-69

中文科名：棕櫚科
英文科名：Palmae
學　　名：*Caryota mitis* Lour.
植物特徵：常綠喬木，株高15-20公尺，單幹，有顯著環紋。二回羽狀複葉，葉甚長(長7公尺，寬5公尺)，小葉楔形，色綠，不規則咬切狀，似孔雀羽毛。雌雄異株，肉穗花序，腋生，長3-4公分，分歧下垂，花甚多。果實稍呈球形，紅熟後，再變成黑褐色。種子成穗細長。
生長習性：公園、庭園之觀賞樹也可做盆栽栽培。
主要成分：含carthamin、neo-carthamin、acarthamone、紅花素、saffor yellow。
藥　　效：用於閉經痛經、瘀血作痛、心絞痛、冠心痛、跌打損傷。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

望江南

編號：TARI-70

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Cassia occidentalis* Linn.
植物特徵：一年生灌木草本。高60-150cm。葉互生，柄基部具腺體1個，小葉偶數對生羽狀複葉，披針形或披針狀橢圓形，長2-6cm，寬1-2cm，先端尖或漸尖，基部近圓形，稍斜，全緣，邊緣具細柔毛，小葉柄極短，被毛。繖房狀總狀花序，腋生或頂生，梗被疏毛。苞片卵形，早落性。
生長習性：零星栽培，多成野生化，故大部藥用採自野生者。
利用部位：莖葉及種子。
主要成分：葉含dianthronic heteroside。根含1,8-dihydroxyanthraquinone，α-hydroxyanthraquinone，emodin，quercetin及physcion與chrysophanol結合成的heterodianthrones等。嫩根含有大黃酚等。種子含大黃素甲醚的匀二蒽酮，rhein，大黃酚，aloeemodin。
藥　　效：莖葉有解熱，清肝，和胃，消腫解毒之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

決明

編號：TARI-71

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Cassia tora* L.
植物特徵：一年生草本，植株較小，被柔毛，一般不超過130cm，臭味較濃。莖上部多分枝。葉互生，偶數羽狀複葉，小葉3對，倒卵形，長2-3cm，寬1.5-3cm，基部兩側不對稱，全緣。花成對腋生，黃色，子房細長。莢果較短，線形，略扁，弓形彎曲，長6-14cm，寬2-5cm。種子稜柱形，褐綠色。花期8-10月，果期9-11月。
生長習性：野生於山坡、林邊。
利用部位：藥用種子。
主要成分：種子含大黃素、大黃酸、鈍葉決明素、黃決明素、chrysophanol、xanthone、蛋白質、穀甾醇、氨基酸等。
藥　　效：有清肝，明目，通便等功能。用於頭痛、眩暈、目赤腫痛、青光眼、降血壓等。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈上〉

香椿

編號：TARI-72

中文科名：楝科
英文科名：Meliaceae
學　　名：*Cedrela sinensis* Juss
植物特徵：落葉喬木，高達15m。樹皮暗褐色，片狀剝落；幼枝有柔毛。雙數羽狀複葉，長25-50mm，有特殊香氣；小葉10-22片，對生，長圓形或長圓狀披針形，長8-15mm，無毛或下面脈腋有長束毛。圓錐花序頂生；花芳香；花萼短小；花瓣白色，卵狀長圓形；退化雄蕊5，與發育雄蕊互生。蒴果卵圓形，長1.5-2.5mm；種子橢圓形，一端有膜質長翅。花期5-6月，果期8月。
生長習性：遍佈各地。
利用部位：根、皮、葉、汁液。
主要成分：川楝素、固醇、鞣質、兒茶酚、胡蘿蔔素、蛋白質、脂肪等。
藥　　效：根有收斂、止血、止痛之效。治神經痛、肝臟及脾臟疾患。樹皮有收斂止血、澀腸止痢、殺蟲解毒之效。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑（4）

青葙

編號：TARI-73

中文科名：莧科
英文科名：Amaranthaceae
學　　名：*Celosia argentea* L.
植物特徵：1年生草本；全株無毛。莖直立，有分枝，綠色或紅紫色。葉互生，紙質，披針形或長圓狀披針形，全緣。穗狀花序圓錐狀或圓柱狀；花頂端帶紅色或全部淡紅色，後變爲白色，具1中脈，向背面突起；種子扁圓形。花期5-7月，果期8-9月。
生長習性：生於坡地、田間、路邊較乾燥向陽處。
利用部位：地上部分或摘取果穗曬乾，收集種子。
主要成分：脂肪油、澱粉、煙酸、硝酸鉀。
藥　　效：抑菌作用、本品乾粉能顯著縮短家兔血漿再鈣化時間、有擴瞳和降壓作用。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(上)

含殼草

編號：TARI-74

中文科名：繖形花科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Centella asiatica* Linn.
植物特徵：多年生匍匐性草本。莖如鐵線狀，常帶淡紫色，全株光滑或偶疏被毛，葉互生，葉片圓形或腎形，小繖形花序，花紫紅色，雙懸果扁圓形。
生長習性：臺灣全境田園、路旁、原野至高海拔山區。
利用部位：全草。
主要成分：積雪草甘、參枯泥甘、異參枯泥甘、羥基積雪草甘、胡蘿蔔羥類、山奈酚、槲皮素。
藥　　效：對中樞神經有鎮靜、安定作用，治療皮膚病、抗菌作用。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (2)

小薊

編號：TARI-75

中文科名：菊科

英文科名：Compositae

學　　名：*Cephalanoplos segetum* (Bunge) Kitam.

植物特徵：多年生草本，高20-50公分。根狀莖長。莖直立，無毛或被蛛絲狀毛。基生葉於花期凋落，下部葉和中部葉橢圓形或橢圓狀披針形，近全緣或有疏鋸齒，有小刺，兩面有疏密不等的白色蛛絲狀毛。頭狀花序單生於莖頂，雌雄異株：瘦果橢圓形或長卵形，稍扁平，冠毛羽狀。花期5-6月，果期6-7月。

生長習性：荒地、田間或路旁。

利用部位：地上部。

主要成分：刺槐素-7-鼠李糖葡萄糖甘、蘆丁、原兒茶酸、咖啡酸、綠原酸、生物鹼、皂甘。

藥　　效：止血、袪痰 、消腫、尿血、急性傳染性肝炎、創傷出血等。

資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

海檬果

編號：TARI-76

中文科名：夾竹桃科

英文科名：Apocynaceae

學　　名：*Cerbera manghas* L.

植物特徵：喬木。樹皮厚，全體任何部位創傷即流出白色乳汁。小枝剛強，具明顯的葉痕。葉叢生枝端，密集互生，柄長1.5-3.5cm，葉革質，平滑有光澤，披針形或倒卵形，長15-25cm，寬4-6cm，兩端漸尖，全緣。聚繖花序，頂生。

生長習性：公園及風景區栽培觀賞。

利用部位：利用種子及全株。

主要成分：種子含cerberoside，cerberin。全株含酸性乳汁，具有刺激性，有毒。

藥　　效：可爲外科膏藥使用或作麻藥用。樹液有瀉下，催吐作用。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

接骨木

編號：TARI-77

中文科名：金粟蘭科
英文科名：Caprifoliaceae
學　　名：*Chloranthus glaber* (Thunb.) Makino
植物特徵：多年生灌木草本。高1-2m，莖圓形，有縱溝紋，節明顯，被粗毛，折傷有紅色汁液流出。葉對生，葉柄基部具葉狀托葉，奇數羽狀複葉，具突起成對腺體，小葉3-11片，長8-15cm，寬4-7cm，頂端1片最大，卵形，兩側小葉爲矩狀披針形至矩卵形，基部鈍圓形或闊楔形，兩側略不對稱，先端漸尖或尾尖形，細鋸齒緣，上面顏色較深，下面較淺，兩面皆疏被粗毛。花期7-8月。果期9-10月。
生長習性：自尼泊爾引進種植。
利用部位：根或全草。

主要成分：含黃酮類化合物、楔葉澤蘭素(eupatolin，nepetin)、咖啡酸等。種子含脂防油、硬脂酸、油酸、亞油酸。
藥　　效：清熱解毒，利尿消腫，涼血止血。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

九節茶

編號：TARI-78

中文科名：金粟蘭科
英文科名：Chloranthaceae
學　　名：*Chloranthus glabra* (Thunb.) Nakai
植物特徵：常綠小灌木。高60-100cm，莖直立，節澎大，節間具縱走稜及淺溝。葉對生，葉片革質，卵狀長橢圓形或披針狀長圓形，無毛。花頂生短穗狀花序，單性，雌雄同株，雌雄合生。花小，黃綠，核果球形，熟紅。花果期7-12月。
生長習性：生長於叢林陰濕處。
利用部位：葉、果實、莖。
主要成分：葉含香豆酮、內酯、黃酮甘、氰甘、揮發油及鞣酸。
藥　　效：治療各種炎症性疾患、類風濕性關節炎及預防感冒。
資料來源：中藥大辭典

吊蘭

編號：TARI-79

中文科名：百合科

英文科名：Liliaceae

學　　名：*Chlorophytum comosum*

植物特徵：多年生常綠草本，花非常小，約直徑一公分而已，一般都在夏天或天氣暖和的時候，才會在走莖上長出小花芽胞，雌蕊如線狀，不易與雄蕊花粉授精，雄蕊的花粉粒就如同百合科的特色，略像橄欖球的形狀，雄蕊數目有六，花瓣數目也是六片。

生長習性：喜溫暖濕潤，喜半陰，夏季忌烈日，適宜在非直曬的光亮陽臺或室內生長。

利用部位：全草。

主要成分：果實含揮發油(土荊芥油)1～4%，油中合驅蛔素(ascaridol)爲有效成分，並含有傘花烴(cymene)、黃樟醚、呫烯類化合物如：檸檬烯(limonene)、異檸檬烯(isolimonene)、左旋松香芹酮(l-pinocarvone)及土荊芥酮(aritasone)、、歐松油烯(sylvestren)等。新鮮葉含兩種山奈醇甘爲：(1)山奈醇-7-鼠李糖甘(kaempferol-7-rhamnoside)；(2)山奈醇-7-鼠李糖甘-葡萄糖-鼠李糖。

藥　　效：祛風除濕，殺蟲，止癢。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

巴西木棉(吉貝樹)

編號：TARI-80



中文科名：木棉科

英文科名：Bombacaceae

學　　名：*Asparagus officinalis* L.

植物特徵：落葉大喬木，高可達25公尺，常高於鄰樹，故名英雄樹。樹皮深灰色，幼樹幹與老樹粗枝均有短而粗大的圓錐形硬刺，以基部爲多；枝輪生而平展，層層向上生長。掌狀複葉互生；葉柄長達20cm；小葉多爲5片，可達7片，小葉柄長約1.5cm，小葉片長橢圓形，長10-16cm，寬4-5.5cm，先端長漸尖，稍呈尾狀，基部寬楔形，全緣，兩面均無毛。早春先葉開花，花簇生於枝端，花冠紅色或橙紅色，直徑約12cm，花瓣5，肉質，橢圓狀倒卵形，長約9cm，外彎，邊緣內卷，兩面均被星狀柔毛；雄蕊多數，合生成管，排成3輪，最外輪集生爲5束。蒴果甚大，木質，呈長圓形，可達15cm，熟後5裂，果瓣內有絲狀綿毛；種子多數，倒卵形，黑色，光滑，藏於白色毛內。

生長習性：生於山地陽坡及村邊、路旁當行道樹。

利用部位：樹皮、根。

主要成分：樹皮及幼根含阿拉伯膠。

藥　　效：花：清熱利濕，解暑。樹皮：祛風除濕，活血消腫。根：散結止痛。

資料來源：原色藥用植物圖鑑(下)

菊

編號：TARI-81

中文科名：菊科
英文科名：Chrysanthemum
學　　名：*Chrysanthemum morifolium* Ramat.
植物特徵：多年生草本，高60-150cm，莖直立性，葉互生，卵形，卵圓形，羽狀缺刻。根狀莖多，少木質化。莖帶紫色，有灰色細毛或絨毛。花頂生，頭狀花序。花形爲球形，小輪花徑，花冠黃色。不結實，花期10-11月。
生長習性：各地多栽培。
利用部位：花。
主要成分：花及全草含揮發油，菊醇、菊油環酮、龍腦等。
藥　　效：外感風熱，風熱眼痛，結膜炎，肝陽上亢頭痛，高血壓頭痛，肝腎不足，慢性肝炎，視神經炎之頭暈眼花。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

牛樟

編號：TARI-82

中文科名：樟科
英文科名：Lauraceae
學　　名：*Cinnamomum micranthum* Hay.
植物特徵：爲常綠大喬木，徑達50cm，樹高可達30m。
生長習性：台灣低至中海拔森林中之特有種樹木。
利用部位：莖幹。
主要成分：樟腦及樟腦油。
藥　　效：木材可供提煉樟腦及樟油外也可製家具及雕刻等用途。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

土肉桂

編號：TARI-83

中文科名：樟科
英文科名：Lauraceae
學　　名：*Cinnamomum osmophloeum* Kanehira
植物特徵：常綠中喬木，株高可達10公尺；5葉近對生，上有明顯的三條脈，長卵形或闊披針形，先端漸尖；葉嚼食含大量粘液，濃烈芳香。聚繖花序，果橢圓形。
生長習性：台灣原生種，分佈海拔500-1500公尺。
利用部位：枝、葉、樹根及皮。
主要成分：桂皮醛及香豆素爲主要成分　。
藥　　效：有溫中補陽，散寒止痛，疏通血脈之效　。
資料來源：藥用植物學

錫蘭肉桂

編號：TARI-84

中文科名：樟科
英文科名：Lauraceae
學　　名：*Cinnamomum zeylanicum* Bl.
植物特徵：長綠喬木，圓錐花序，乳白色小花，有惡臭，漿果紫色，從萌生枝條可採收手指粗的莖。
利用部位：葉、樹皮、莖、根。
主要成分：揮發油、桂皮醛、丁香酚、鞣質、黏液質。
藥　　效：樹皮卷爲佳餚添加劑；葉油具防腐性、滋補性，可治療噁心和高血壓。孕婦要避免使用這些油，會引發流產。
資料來源：藥用植物圖鑑

粉藤

編號：TARI-85

中文科名：葡萄科
英文科名：Vitaceae
學　　名：*Cissus repens* Lamarck
植物特徵：多年生攀緣性藤本。全株粉綠色而光滑，地下具肥大塊根，莖圓筒形而粗厚柔韌，被白粉，卷鬚單1先端2歧。葉互生，葉片心臟形或廣卵形，全體皺褶狀，稍肉質柔軟，基部闊心臟形，先端短尖或漸尖，疏鋸齒緣，葉脈4-5對，背面隆起，兩面均無毛。聚繖花序與葉對生，花細小，淡黃色或綠黃色。花萼微小，花瓣4片，卵狀三角形，稍厚。花柱鑽形。漿果倒卵形，熟時紫,熟時紫色，內具種子1-2粒。花果期夏、秋間。
生長習性：全境平野至低海拔山地叢林中或村落空墟地。
利用部位：根、藤、葉或全草入藥。
主要成分：藤類酚類、氨基酸、有機酸、糖類的反應。
藥　　效：塊根有清熱，涼血，解毒，消腫之效。藤有清肺，解毒之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉

過山香

編號：TARI-86

中文科名：芸香科
英文科名：Rutaceae
學　　名：*Clausena excavata* Burm. f.
植物特徵：落葉性灌木；全株皆有臭味，嫩枝及葉被茸毛。羽狀複葉，對生，小葉如新月形，先端略呈凹形，葉基歪斜，全緣，葉柄極短，約近於無柄。圓錐花序，頂生，花梗被茸毛，花黃色，花小，花徑0.8公分。核果長橢圓形，長1-1.5公分，成熟果紅色。
生長習性：山野叢林內自生。
利用部位：根幹。
主要成分：藤類酚類、氨基酸、有機酸、糖類的反應。
藥　　效：葉具殺蟲效果、成熟果實可供食用、根部爲民間常用之發汗劑。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(2)

化石樹

編號：TARI-87

中文名稱：化石樹
中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Clerodendrum calamitosum* L.
植物特徵：常綠灌木，株高約1-2公尺，全株有特殊味道。葉的形態：葉對生，橢圓形或倒卵形，粗鋸齒緣，粗皺狀；花的形態：聚繖花序頂出腋生，花冠純白，五瓣；萼片暗紅色；果實：核果球形，熟時紫黑色；
花 果 期：秋至冬初開花。

臭茉莉

編號：TARI-88

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Clerodendrum lindleyi* Decne. Ex Planch
植物特徵：小灌木，高1-2米。莖直立，小枝方形，全株密披絨毛，葉具長柄，對生，膜質，卵圓形。聚繖花序，頂生數朵花冠白色、基部淡紅色花，花朵群聚如繡球花一般。花期4-12月。
生長習性：生於村邊、山野曠地上。
利用部位：根、葉。
主要成分：含黃酮甘、酚類、皂甘、鞣質等。
藥　　效：治風濕關節炎、腰腿痛、腳氣水腫、白帶、支氣管炎、痔瘡、脫肛、慢性骨髓炎等。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (5)

龍船花

編號：TARI-89

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Clerodendrum paiculatum* L.
植物特徵：常綠小灌木。全株無毛。葉對生，薄革質，披針形，有極短的柄。花冠紅色或橙黃色，聚傘花序頂生。核果，球形，熟時碧黑色。盛花期初夏至秋天。
生長習性：臺灣全境平野至山區多見，常成群散生。
利用部位：帶根的全株，去枝葉。
主要成分：葉含馬纓丹烯A(Lantadene A, 0.31～0.68%, 乾重)、馬纓丹烯(0.2%, 乾重)。前者對羊有毒。另含三帖類馬纓丹酸(Lantanolic acid)和馬纓丹異酸(Lnatic acid)、還原糖、鞣質、樹脂，以及生物鹼。此外，還含揮發油0.16～0.2%其主要成分爲葎草烯(Humulene)、β－石竹烯(β-Caryophyllene)、γ-松油烯(γ-Terpinene)、α-蒎烯(α-Pinene)和對一聚傘花素(ρCymene)等。嫩枝中也含馬纓丹烯A。
藥　　效：消腫解毒，祛風止癢。治癰腫，濕毒，疥癩，毒瘡。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (3)

蝶豆

編號：TARI-90

中文科名：蝶形花科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Clitoria ternatea* L.
植物特徵：多年生纏繞性草本，全株有毛，奇數羽狀複葉，小葉2-4對，紙質，長2.5-5公分，寬1.5-3公分，先端鈍、微凹或具有短尖突；托葉小型，披針狀，有毛；夏季開花，花朵單立，腋出，梗極短，苞片2枚，披針狀；花萼筒狀，先端5裂，裂片亦呈披針形；花冠挺出，藍紫色或白色，旗瓣特大，翼瓣及龍骨瓣短小；單體雄蕊，莢果扁平，長線形，內藏種子6-10粒。
生長習性：砂礫灘及庭園路旁生長。
利用部位：根、葉、花、種子。
主要成分：全株含皂甘、類黃酮類、生物鹼類。葉含山奈酚-3-葡萄糖甘。
藥　　效：根有緩瀉、利尿之效。治腹水、發熱、慢性氣管炎。葉浸出液治發疹、耳疾。種子及根均有治吐、瀉下、利尿、通經、驅蟲之效。花治眼疾。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

蛇床子

編號：TARI-91

中文科名：繖形科

英文科名：Umbelliferae

學　　名：*Cnidium monnieri* (L.) Cuss.

植物特徵：一年生草本。根細長，圓錐形。莖直立或斜上，多分枝。基生葉矩圓形或卵形，三出或羽狀分裂，複繖形花序頂生或腋生，線形治線狀披針形，邊緣膜質。分生果長圓形。花期4-5月 ，果期6-8月。

生長習性：生於溝邊、路旁、田間、草地、河邊溼地。

利用部位：種子。

主要成分：果實含揮發油、二氫歐山芹素、圓當歸素、異茴芹素、乙醯二氫歐三芹酯、二氫歐山芹醇等。

藥　　效：味辛、苦、性溫。有小毒。有散寒、祛風、燥濕、殺蟲、止癢、壯陽功能。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(下)

變葉木

編號：TARI-92

中文科名：大戟科

英文科名：Euphorbiaceae

學　　名：*Codiaeum variegatum* (L.) Bl.

植物特徵：常綠灌木或小喬木，高1-5m。幼枝灰褐色，有明顯的大而平整的圓形或近圓形葉痕。葉互生；葉柄長0.5-2.5cm，有時更長；葉片近革質，形狀和顏色變化很大，條形、條狀長圓形、披針形、倒披針形、卵狀長圓形、倒卵狀長圓形、橢圓形或匙形，長6-38cm，寬不等，爲0.5-4cm，先端急尖、鈍形至圓形，基部楔形、鈍或圓，全緣或具裂片，扁平、波狀至螺旋狀，有時葉片中部兩側深裂至中脈，將葉分成上、下兩小片，綠色或淡綠色或紫色，常間以白色、黃色、紅色斑紋。總狀花序腋生；花小，單性同株而異序，花多數，淡黃色或淺綠色；雄花序長7-30cm，通常2-6朵簇生花序軸上；花梗纖細，開花時長5-30mm；萼5裂，裂片近圓形或卵圓形或闊橢圓形，長2.5-3mm，外彎；花瓣5，形狀不一，大小不等，遠較花萼短；花盤腺體5枚，與萼片對生；雄蕊約30，花絲稍寬而扁，長3-4mm，集生於近半球形的肉質花托上，花柄近球形，藥隔寬而扁，貼生於兩側，先端接連；雌花序長10-17cm，單生花序軸上；花梗稍粗壯；萼5裂，裂片近圓形至卵狀三角形 ；花盤杯狀；子房近球形至卵形，3室，花柱2，分離，外彎，柱頭不裂。蒴果球形，稍具3稜，頂基略壓扁，白色，種子褐色而稍帶雜色斑紋，平滑。花期6-9月 。

生長習性：通常盆栽。各地均有栽培，作觀賞植物。

利用部位：葉、根。

主要成分：新鮮葉含乙醯膽鹼(acetylcholine)，膽鹼(choline)，乙醯膽鹼酯酶(acetylcholinesterase)、丙醯基膽鹼(propinoylcholine)，葉綠素(chlorophyll)a、b。又含類胡蘿蔔素(carotenoid) ，花青甘類(anthocyanins)。此外，成熟的葉中含順式-和反式-對-香豆酸(cis- and trans-p-coumaric acid)，反式阿魏酸(trans-ferulic acid)，香草酸(vanillic acid)，原兒茶酸(pro

藥　　效：散瘀消腫，清熱理肺。主治跌打腫痛，肺熱咳嗽。其煎汁爲發汗劑，內服並外用；治咳嗽亦效。根搗爛，敷梅毒潰瘍。

資料來源：藥用植物學

丹參

編號：TARI-93

中文名稱：丹參
中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Codonopsis pilosula*
植物特徵：多年生草本。莖高40-80cm。葉常爲單數羽狀複葉，葉片 爲卵形或橢圓狀卵形。假總狀花序，花冠藍紫色，花期4-6月，果期7-8月。
生長習性：生於山坡草地、林下、溪旁。
利用部位：根。
主要成分：tanshinone I 、tanshinone II、cryptotanshinone、isotanshinone (I 、II)、iso-cryptotanshinone、methyl tanshinone、hy-droxytanshinone、miltirone。
藥　　效：活血通經、祛瘀止痛。
資料來源：藥用植物專輯

黨參

編號：TARI-94

中文科名：桔梗科
英文科名：Campanulaceae
學　　名：*Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.
植物特徵：多年生草本。根長圓柱形，直徑1-1.7mm，頂端有一膨大的根頭，具多數瘤狀的莖痕，外皮乳黃色至淡灰棕色，有縱橫皺紋。葉對生、互生或假輪生；具柄，葉柄長0.5-4mm，被疏柔柔毛；葉片卵形或廣卵形，長1-7mm，寬0.8-5.5mm，先端鈍或尖，基部截形或淺心形，全緣或微波狀。花單生，具細花梗。種子小，褐色有光澤。芯期8-9月。果期9-10月。
生長習性：生於山地灌木叢中及林緣。
利用部位：根。
主要成分：含皂甘、微量生物鹼、蔗糖、葡萄糖、菊糖、澱粉、粘液及樹脂等。
藥　　效：對血細胞的影響、對血糖作用、降壓作用。
資料來源：中藥大辭典(下)

薏苡

編號：TARI-95

中文名稱：薏苡
中文科名：禾本科
英文科名：Gramineae
學　　名：*Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman) Stapf
植物特徵：一年生草本，莖直立，有節。葉鞘長於節間，葉舌硬，頂端有短毛，葉片條狀披針形，邊緣稍粗糙，總狀花序腋生，成束，常下傾，小穗單性，雌小穗位於花序下部，包藏於總苞中，常2-3小穗生一節，僅一枚發育成熟，總苞卵形，果實成熟時總苞堅硬，內含一穎果。
生長習性：生於河邊、溪流邊或陰濕河谷中。
利用部位：種子。
主要成分：coixenolide,coiol,穀甾醇。
藥　　效：健脾利濕，清熱排毒。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈下〉

彩葉草

編號：TARI-96

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Coleus hybridus* Voss
植物特徵：多年生草本。植株約20到80公分，莖有稜角，全株密被細毛，葉對生，卵圓形或長卵形，葉緣有細鋸齒。以觀葉為主，屬於觀葉植物。葉色豐富，為觀葉植物中色彩最鮮明的。
生長習性：台灣中部及北部山區陰涼之山谷，溪旁或疏林內自生。各地觀賞種植。
利用部位：全株。
主要成分：新鮮葉含乙醯膽鹼(acetylcholine)，膽鹼(choline)，乙醯膽鹼酯(acetylcholinesterase)、丙醯基膽鹼(propinoylcholine)，葉綠素(chlorophyll)a、b。又含類胡蘿蔔素(carotenoid)，花青甘類(anthocyanins)。此外，成熟的葉中含順式-和反式-對-香豆酸(cis- and trans-p-coumaric acid)，反式阿魏酸(trans-ferulic acid)，香草酸(vanillic acid)，原兒茶酸(protocatechuic acid)，而嫩葉中綠原酸(chlorogenic acid)，對-羥基苯甲酸(p-hydroxybenzoic acid)的含量較高。
藥　　效：散瘀消腫，清熱理肺。主治跌打腫痛，肺熱咳嗽。其煎汁為發汗劑，內服並外用；治咳嗽亦效。根搗爛，敷梅毒潰瘍。
資料來源：藥用植物學

紫錦跖草

編號：TARI-97

中文科名：鴨跖草科
英文科名：Commelinaceae
學　　名：*Setcreasea purpurea*
植物特徵：一年生草本；植株高20-60釐米，莖多分技，基部匍匐而節上生根，上部上升。單葉互生，披針形或卵狀披針形，長4-9釐米，寬1.5-2釐米，葉無並或幾無柄。佛豔苞片有柄，心狀卵形，長1.2-2釐米，邊緣對合折疊，基部不相連，有毛；花藍色。果橢圓形，2室，每室有2種子，種子表面有皺紋。花果期6-10月。
生長習性：生於路旁，田埂，山坡、林緣陰濕處。
利用部位：全草。
藥　　效：清熱、利尿藥。
資料來源：全國中草藥匯編

朱蕉

編號：TARI-98

中文科名：龍舌蘭科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Cordyline fruticosa* (L.) Goepp
植物特徵：灌木。植株高達3m。莖單一或由基部株。葉呈2列旋轉聚生莖端，基部抱莖，葉片紫紅色，披針狀橢圓形或長矩圓形，長30-50cm，寬30-50cm，基部漸狹尖，先端漸尖，中脈明顯，側脈狀平行。圓錐花序由多數分枝之穗狀花序而成。主軸之苞片條狀披針形，穗軸之苞片卵狀小形。花淡紅色至紫色，小花梗極短。
生長習性：華南。
利用部位：花及葉。
主要成分：葉含酚類，氨基酸，糖。
藥　　效：葉有清熱、涼血、止血、散瘀之效。花有止血、祛痰之效、治痰火。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

閉鞘薑

編號：TARI-99

中文科名：薑科
英文科名：Zingiberaceae
學　　名：*Costus speciosus* (Koen.) Smith
植物特徵：大型草木。高1-2.5m。根莖塊狀，橫生，莖基部木質化。葉旋狀排列，無柄，葉片長圓形至披針形，長1.5-20cm，寬6-7cm，基部圓形，先端漸尖或尾尖，全緣，平行脈由中央羽狀斜出，背面密生絹毛。葉鞘抱莖封閉。花期7-9月。果期10-12月。
生長習性：中國華南，菲律賓，瓜哇，馬來西亞，印度。
利用部位：根莖。
主要成分：根莖含總皂甘元。
藥　　效：根莖有行水、消腫、落胎、殺蟲之效。治水腫膨脹、白濁、小便刺痛、癰腫惡瘡。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

石蓮花

編號：TARI-100



中文科名：景天科
英文科名：Crassulaceae
學　　名：*Graptopelaum paraguayense*
植物特徵：草本或亞灌木，通常爲肉質狀。葉互生、對生或輪生，單生，多數無柄，全緣，有鋸齒、淺裂或羽狀裂，無托葉。果實爲蓇葖果，膜質或毛質，常爲殘存之膜質花瓣所包被，開裂；種子小，常有肉質胚乳。
生長習性：台灣各地許多家庭有零星栽培觀賞與供藥用，中南部則有大規模的栽培。
利用部位：全草。
主要成分：根莖含總皂甘元。
藥　　效：全草主治跌打損傷，喉炎，熱癤等症，對於濕熱型（急性且發熱，臉黃，尿黃赤）的肝炎具有清熱解毒之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

文殊蘭

編號：TARI-101

中文科名：石蒜科
英文科名：Amaryllidaceae
學　　名：*Crinum asiaticum* L. var. *sinicum* Bak.
植物特徵：多年生粗壯草本。鱗莖粗壯，圓柱形。莖粗大，肉質，高達1公尺，基部徑粗約10-15cm。葉多枚，肉質，舌狀披針形或帶狀披針形，反曲下垂，長可達1米，寬7-12cm或更寬，先端漸尖，邊緣波狀，暗綠色，有草腥味。夏季從葉腋間生出直立的肉質花葶，傘形花序頂生，通常有花10-24朵；佛焰苞片披針形，外折，長6-10cm，白色，膜質；花白色，芳香，梗長約0.5-2cm，花被管纖細、伸直，呈高腳碟狀，裂片6，條形，長6-9cm，寬7-9cm，向先端逐漸狹窄；小苞片窄條形，長3-7釐米。果實近球形。

生長習性：生於濱海地區或河旁沙地以及山澗林下陰濕地。
利用部位：葉和鱗莖。
主要成分：含石蒜鹼(lycorine)、多花水仙鹼(tazettine)等多種生物鹼。
藥　　效：有小毒。行血散瘀，消腫止痛。
資料來源：全國中草藥匯編·上冊

蘄艾

編號：TARI-102

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Crossostephium chinense* (L.) Makin
植物特徵：多年生草本或亞灌木。多分枝密集成圓團狀灌叢，灰白色絨毛，具香氣。葉密生枝端成叢生，葉片柔革質，狹倒卵狀，先端三淺裂，裂片卵形或狹矩圓形。頭狀花序，球形，花雜性，瘦果長橢圓形，5稜。花期冬、春間。

生長習性：海岸及珊瑚礁上自生。
利用部位：全草。
主要成分：全草含taraxerol、taraxerone、taraxeryl acetate。
藥　　效：全草有祛風、除濕、固肺、解熱、解毒之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

落水金剛

編號：TARI-103

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Croton tiglium* L.

植物特徵：常綠灌木或喬木，高2-7公尺。樹皮深灰色，平滑，稍呈細線縱裂；新枝綠色，被稀疏的星狀毛。單葉互生，具柄；葉片卵形或橢圓狀卵形，長7-17cm，寬3-7cm，先端長尖，基部寬楔形，邊緣有淺疏鋸齒，上面深綠色，下面較淡，初時兩面疏被星狀毛，基部具3脈，近柄兩側各具1腺體。夏季開綠色花，總狀花序頂生，花單性，雌雄同株，雌花在下，雄花在上，萼片5，被星狀毛，雄花無退化子房，雄蕊多數，花絲在芽內彎曲；花盤腺體與萼片對生；雌花無花瓣，子房3室，密被星狀毛。蒴果倒卵形或長圓狀，有3個鈍角，無毛或有星狀毛，3室，每室含種子1粒，種子即巴豆，略呈橢圓形或卵形，稍扁，長1-1.5cm，寬8-10mm，厚約4-7mm；表面黃棕色至暗棕色，平滑而少光澤。種阜在種臍的一端，為一細小突起，易脫落。合點在另一端，為圓形小點，合點與種阜間有種脊，為一略隆起的縱棱線。種皮薄而堅脆，剝去後，可見種仁，油質，不能口嘗。
生長習性：生於山坡、溪邊、林中向陽處。
利用部位：種子、根、葉。
主要成分：種仁含脂脂油(巴豆油)約40～60%，油中含巴豆樹脂(croton resin)，系巴豆醇(phorbol)、甲酸、丁酸及巴豆油酸(crotonic acid)結合而成的酯，有強烈的致瀉作用。此外，含蛋白質18%，其中包括一種毒性球蛋白，稱巴豆毒素(crotin、類似蓖麻子毒蛋白)。另含有精氨酸、賴氨酸及一種類似蓖麻鹼(ricinine)的生物鹼。
藥　　效：種子：辛，熱；有大毒。瀉下祛積，逐水消腫；根、葉：辛、溫，有毒。溫中散寒，祛風活絡。

裏白巴豆

編號：TARI-104

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Croton tiglium* Linn.

植物特徵：常綠灌木或小喬木。幼枝綠色，無毛或被稀疏星狀毛，葉互生，葉片卵形或長圓狀卵形，花單性，雌雄同株，總狀花序頂生。蒴果長圓形至倒卵形，3鈍稜。種子3枚，長圓形，淡黃色。
生長習性：埔里、嘉義、屏東、臺東、花蓮等原有自生者。今中南部散見人家零星栽培。
利用部位：種子。
主要成分：種子含巴豆油，油中含巴豆油酸、巴豆酸、棕櫚酸、硬脂酸、油酸等甘油脂。另含巴豆毒素、巴豆酸、生物鹼、β-穀固醇等。
藥　　效：種子瀉寒積，通關竅，行水、逐痰、殺蟲之效。巴豆殼有消積滯、止瀉痢。巴豆樹根有溫中散寒，祛風散消腫之效。巴豆油治中風痰厥、氣厥。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

鴨兒芹

編號：TARI-105

中文科名：繖形科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Cryotitaebua cabadebsus* (L.) DC.
植物特徵：多年生草本。高30-80cm。根莖短，莖直立，花期時上部分枝。根際葉具長柄，莖生葉逐上則柄漸短，葉片亦變小。葉三出，故名三葉。小葉幾無柄，稜狀廣卵形或長橢圓狀披針形，長3-9cm，寬2-7cm，基部鈍形或漸狹，先端銳尖，不整狀細鋸齒緣，偶作斷續略深裂。果實線狀長卵形，兩懸果，平直或微彎，長3-4mm，具果稜。花期3-6月。
生長習性：臺灣中、北部山區陰濕處歸自生，往往成群生。
利用部位：全草、果。
主要成分：全草含揮發油。
藥　　效：祛風活血、舒經去瘀、解毒消腫。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(1)

山芹菜

編號：TARI-106

中文科名：繖形科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Cryptotaenia japonica* Hassk.
植物特徵：多年生草本，高40-70cm，全體有香氣。根狀莖很短；根細長，密生。莖直立，具叉狀分枝。葉互生，三出復葉，葉柄基部稍擴大成膜質窄葉鞘而抱莖，小葉無柄；中間小葉菱狀倒卵形，長3-10cm，邊緣有不整齊重鋸齒，基部下延，側生小葉歪卵形，有時2-3淺裂。夏季開白色小花，有時帶紫紅色，爲頂生及腋生的複傘形花序，傘梗3至數條，有不等長的圓錐狀分枝，小傘梗2-4條，使花序呈疏鬆圓錐狀。萼齒5，退化；花瓣5，先端長而內彎；雄蕊5，花藥縱裂；雌蕊1，子房下位，2室，每室1胚珠。雙懸果長橢圓形，分果常圓而不扁，有5棱，主棱發達，次棱不顯，每棱間有油管3個，結合面3-4個。
生長習性：生於低山林邊、溝邊、田邊濕地或溝谷草叢中。
利用部位：全草。
主要成分：含有揮發油，油的主要成分爲鴨芹烯(cryptotaenen)、開加烯(kiganen)、開加醇(kiganol)。果實中含有岩芹酸(petroselic acid)。
藥　　效：祛風止咳，活血祛瘀。
資料來源：全國中草藥匯編

大仙茅

編號：TARI-107

中文科名：仙茅科
英文科名：Amaryllidaceae
學　　名：*Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze
植物特徵：多年生草本。根莖塊狀。植株高50-100cm。葉叢生基部，葉片矩圓狀披針形，隨葉脈折疊而曲折，基部楔形，先端尖，全緣，光滑或葉背脈被毛，脈射出狀。頭狀花序或短穗狀花序，花黃色，具短柄。蒴果棒狀，花期4-6月。
生長習性：台灣全境平野至低海拔山區廣見自生。
利用部位：花、根。
主要成分：含有揮發油，油的主要成分爲鴨芹烯(cryptotaenen)、開加烯(kiganen)、開加醇(kiganol)。果實中含有岩芹酸(petroselic acid)。
藥　　效：治虛勞咳嗽、遺精、白濁、崩漏、白帶、風濕痹痛、骨痛。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑（2）

鬱金

編號：TARI-108

中文科名：薑科
英文科名：Zingiberaceae
學　　名：*Curcuma aromatica* Salisbury
植物特徵：多年生宿根性草本。株高80-120cm。根狀莖肉質肥厚，橢圓形或長橢圓形，斷面黃色，芳香。根粗末端膨大呈紡錘形。葉叢生基部，具長柄，葉片長橢圓形，先端細尾尖，全緣，葉背被短柔毛。花葶由根莖生出，具鞘狀葉，穗狀花序圓錐形。
生長習性：全省各地零星栽培及山野馴化自生。
利用部位：根部。
主要成分：塊根含揮。
藥　　效：塊根有行氣解鬱，化瘀止痛，利膽退黃，涼血止血之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

莪鬱金

編號：TARI-109

中文科名：莪鬱金科

英文科名：Cucurbitaceae

學　　名：*Curcuma aromatica* Salisbury

植物特徵：多年生宿根性草本。株高80-120cm，根狀莖肉質肥厚，橢圓形或長橢圓形，根粗末端肥大呈紡錘形。葉片長橢圓形，先端細尾尖，全緣具鞘狀葉，穗狀花序圓錐形，苞片長圓形，白色帶紅暈，頂端具小突尖，被毛，花萼筒形，白色被疏毛，花冠漏斗狀。

生長習性：全省各地零星栽培或山野馴化自生。

利用部位：根狀莖。

主要成分：camphene,camphor,sesquiterpenes,phellandrene,curcumol,curcumin,turmerone。

藥　　效：行氣解鬱，化瘀止痛，利膽退黃，涼血止血。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈5〉

薑黃

編號：TARI-110

中文科名：薑科

英文科名：Zingiberaceae

學　　名：*Curcuma longa* Linn

植物特徵：宿根性多年生草本。根末端澎大成長卵形或紡錘狀塊根。根莖橢圓形或長橢圓形，穗狀花序稠密，每花各有一苞片，白色或淺紅色。蒴果膜質，球形，種子卵狀長圓形。

生長習性：山區栽培。

利用部位：根莖。

主要成分：揮發油、薑黃酮、薑油烯、水芹烯、香檜烯、龍腦。

藥　　效：利膽作用、抗菌作用、對眞菌有抑制作用、鎮靜作用。

資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (2)

莪朮

編號：TARI-111

中文科名：薑科
英文科名：Zingiberaceae
學　　名：*Curcuma zedoaria* (Berg.) Rosc.
植物特徵：多年生草木，高80-150cm。塊根紡錘狀，斷面黃綠色近白色。主根莖陀羅狀或錐狀陀羅形，側根莖指狀，斷面黃綠色至墨綠色或有時灰藍色。花期4-6月。
生長習性：生於山坡、村旁或林下。
利用部位：根莖及塊根。
主要成分：根莖含α及β蒎烯、莰烯、檸檬烯、1，8-桉油素、芳樟醇、龍腦、樟腦、薑烯、芳薑黃火烯、薑黃酮、莪朮酮。
藥　　效：有破瘀行氣、消積止痛的功能。有解鬱行氣、化瘀止痛、利膽和清心的功能。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(下)

美葉鳳尾蕉

編號：TARI-112

中文科名：蘇鐵科
英文科名：Cycasaceae
學　　名：*Eamia furfuracea*
植物特徵：羽狀葉多向四周伸長，長可達30-60cm以上，具刺柄。羽片較厚而大，倒披針形，葉背密佈鱗屑，全株終年青綠。
生長習性：日照充足，性喜高溫多濕，生長緩慢。
資料來源：http://www.js.mlc.edu.tw/

蘇鐵

編號：TARI-113

中文科名：蘇鐵科
英文科名：Cycasaceae
學　　名：*Cycas revoluta* Thunb.
植物特徵：常綠性灌木，株高二至五公尺，樹幹短而粗，密留落葉後之葉痕。一回羽狀複葉叢生在幹頂，幼葉密被淡黃色毛茸，並有卷曲現象；老葉則爲光滑的濃綠色。小葉質地堅硬，甚至會傷人，葉背有反卷之葉緣，是重要特徵之一。花雌雄異株，雄花序長圓筒狀，形如巨大的松毬；雌花序圓球狀，胚珠長在櫛狀心皮的基部。種子爲扁倒卵形，有如放大的玉米粒，徑約二至三公分餘，外種皮橙紅色，十分漂亮。

利用部位：葉、花、種子、嫩莖、樹皮、根。
主要成分：葉含蘇鐵甘(Cycasin)，此甘有毒，並有抗癌作用
藥　　效：嫩莖、樹皮搗碎，可敷腫毒；葉：各種出血，胃炎，胃潰瘍，高血壓，神經痛，閉經，癌症。花：理氣止痛，治遺精、白帶、痛經。種子：高血壓。根：肺結核，腰痛，跌打損傷。
資料來源：常見中草藥第二輯

香茅

編號：TARI-114

中文科名：禾本科
英文科名：Gramineae
學　　名：*Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf
植物特徵：多年生草本。叢生，全株具檸檬香氣。稈高1-2m，被白蠟粉。葉鞘抱莖無毛。葉舌鱗片狀。葉片簇生，條形，邊緣粗澀，兩面被粉白物。圓錐花序疏散，由節生多數總狀花序組成。
生長習性：零星種植。
利用部位：根及全草。
主要成分：根、根莖、莖及葉含揮發油。
藥　　效：風濕疼痛、頭痛、胃痛、腹痛、腹瀉、月經不調、產後水腫、跌打瘀血腫痛。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

朝鮮薊

編號：TARI-115

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Cynara scolymus* L.
植物特徵：葉大肥厚，披針形、密被茸毛，葉緣深裂。多分枝，6-7月間枝端生肥嫩花蕾，以主莖花蕾最大，稱王蕾。種子粒大、扁橢圓形，褐或白色。
生長習性：喜冷涼濕潤氣候，耐輕霜、忌幹熱。
利用部位：苞、花托、葉柄。
主要成分：磷脂膽鹼、磷脂醯乙醇胺、磷脂醯肌醇。
藥　　效：補肝腎、益精血、強筋骨。治頭昏眼花、健忘、鬚髮早白、筋骨不健。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(上)

黃藤

編號：TARI-116

中文科名：棕櫚科
英文科名：Palmae
學　　名：*Calamus quinquesstinervis* Palmae
植物特徵：藤本。莖長達50cm以上，逐漸成長，葉鞘則漸剝落，有節，具光澤，圓筒形。葉叢生莖端，羽狀複葉，長1-2m，小葉2每片或1片互生，線形或披針形，平行脈，橫脈細微，先端漸尖銳，細鋸齒緣。花期夏季。果期秋天。
生長習性：臺灣全境低海拔山區森林內。
利用部位：地下部分及嫩心。
主要成分：根含掌葉防己鹼、蘗根鹼、非洲防己鹼、黃藤素甲、黃藤素乙、黃藤內酯、甾醇。
藥　　效：根有清血，涼血，解熱，祛風，降血壓之效。治高血壓，中風，半生不遂。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

毛柿

編號：TARI-117

中文科名：柿樹科
英文科名：Ebenaceae
學　　名：*Dianella ensifloia* (L.) DC.
植物特徵：常綠大喬木，小枝，葉柄葉，背均有黃褐色，漿果成熟呈朱紅色，密生長柔毛。
生長習性：臺灣、菲律賓。
利用部位：果實。
主要成分：塊莖含澱粉、粘液質、膽鹼、尿囊素及16種氨基酸、多酚氧化酶、維生素C等。
藥　　效：有補脾胃、益肺、益胃、澀精縮尿的功能。用於脾虛泄瀉、便溏久瀉、腎虛遺精、小便頻數、肺虛喘咳、虛勞痰嗽、食少倦怠、脾虛帶下、小兒疳積等。還用於氣陰兩虧的消渴症。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑（下）

扁豆

編號：TARI-118

中文名稱：扁豆
中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Dolichos lablab* L.
植物特徵：一年生纏繞草質藤本，莖毛或被柔毛。葉三出複葉；托葉披針形或三角狀卵形，被毛，頂生小葉寬三角狀卵形，全緣，兩面均被疏短柔毛；總狀花序腋生，花萼寬鐘狀，花冠蝶形。莢果倒卵狀長橢圓形，扁平。種子扁橢圓形，白色。花期6-8月，果期9月。
生長習性：分布華東和遼寧、河北、河南、廣東、廣西等地。
利用部位：種子、花。
主要成分：種子含蛋白質，維生素B及C、胡蘿蔔素、Stachyose、麥芽糖、棉子糖、1-pipecolic acid、phytoagglutinin。
藥　　效：種子用於脾胃虛弱、少食便溏、暑濕吐瀉、赤白帶、小兒疳積。花用於中暑發熱、嘔吐、赤白帶下、痢疾。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(上)

萬年青

編號：TARI-119

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Dracaena sanderiana*
植物特徵：多年生常綠草本，無地上莖，根莖黃白色；葉自根狀叢生， 3-9枚，質厚，深綠色；春夏自葉叢中生出花莖，花多數，排列呈穗狀，花淡綠白色；漿果球形，橘紅色，內藏種子一粒。
生長習性：栽培於庭園，或野生於陰濕的林下、山谷。
利用部位：根莖。
主要成分：含脂肪油(蓖麻油)、蓖麻毒素(ricin)、解脂脢(lipase)、毒性蛋白質、蓖麻鹼。
藥　　效：根莖爲強心利尿劑；生根煎汁可敷蛇傷　。
資料來源：中藥大辭典(下)

十大功勞

編號：TARI-200

中文科名：小檗科
英文科名：Berberidaceae
學　　名：*Mahonia fortunei* (Lindl.)Fedde
植物特徵：常綠灌木，高達2米。葉互生，一回羽狀複什，葉長15-30釐米，小葉5-9，革質，狹披針形，長5-12釐米，寬1-2.5釐米，側生小葉幾等長，頂生小門最大，均無柄，頂端急尖或略漸尖，基部狹楔形，邊緣有6-13刺狀銳齒。總狀花序直立， 4-8個簇生；花黃色；花梗長1-4毫米。漿果圓形或長圓形，長4-5毫米，藍黑色，有白粉。花期7-8月。
生長習性：生於山谷、林下濕地。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：含小檗鹼等生物鹼。
藥　　效：滋陰強壯、清涼、解毒。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(5)

蛇莓

編號：TARI-121

中文科名：薔薇科
英文科名：Rosaceae
學　　名：*Duchesnea indica* (Andr.) Focke
植物特徵：多年生草本，有長匍匐莖，長可達1公尺，全體被白色絹毛。三出複葉基生或互生，有長柄，柄長5-8 cm，基部有2枚廣披針形托葉；小葉菱狀卵形，長1.5-3cm，寬1.2-2 cm，先端鈍，基部寬楔形，邊緣具鈍圓齒牙，兩面散生柔毛或上面近無毛。春末開花，花單生於葉腋；花梗甚長，可達5.5cm；花萼2輪，內輪萼片5，較小，廣披針形，外輪萼片較寬，先端3淺裂；花冠黃色，直徑約1.2-1.8cm，花瓣5，寬倒卵形，先端微凹；雄蕊多數。瘦果小，扁圓形，多數，生在膨大球形花托上，聚合成卵狀球形的聚合果，直徑約1cm，紅色。
生長習性：生於山坡草叢、田邊及路旁。
利用部位：全草。
藥　　效：清熱解毒，散瘀消腫。
資料來源：常見中草藥第四輯

金露花

編號：TARI-122

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Duranta plumieri* Jacq.
植物特徵：常綠灌木，小枝方形，葉腋具銳刺，單葉對生或輪生，具短柄，葉片長3-7cm，寬2-4cm，卵狀披針形、橢圓形、或倒卵形，葉基闊楔形，葉尖銳形，葉緣全緣上半部鋸齒緣。花序爲總狀花序，頂生或腋出；花萼筒形，先端截形，5齒裂，花後增大；花冠藍紫色或白色，長1.2-1.5cm， 5裂，裂片具不規則齒牙，花筒略彎曲；雄蕊4枚，2長2短；著生花筒基部；花絲被腺毛，果實爲核果，直徑約1cm，球形，成熟時金黃色，內藏種子4-5顆，花期自5月至9月。
生長習性：台灣各地栽培供作觀賞用。
利用部位：葉、果。
主要成分：種子油的主要脂肪酸爲亞油酸(53.1%)，非皂化物質有烴、醇和甾醇。
藥　　效：甘、微辛，溫。有小毒。散熱透邪，行血祛瘀，止痛殺蟲，消腫解毒。

紫錐花

編號：TARI-123

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Echinacea purpurea* L.
植物特徵：每株花枝數平均3-5枝，每株花期達2個月，單枝花期約兩星期，可收穫種子。春作落葉後，萌發新芽，3月上旬開始陸續開花。
生長習性：原產美洲，台灣目前已有栽種。
利用部位：根、莖、葉、花。
主要成分：含松果菊甘、多醣體(polysaccharides)、alkamides、phenylpropanoid、cichoric acid等。
藥　　效：抗病毒、抗眞菌、抗腫瘤、消炎等作用。

胡頹子

編號：TARI-124

中文科名：胡頹子科
英文科名：Elaeagnaceae
學　　名：*Elaegnus pungens* Thunb.
植物特徵：爲常綠灌木，高3-4公尺，刺頂生或腋生，長20-40mm或稍過之；嫩枝稍壓扁，密被銹色鱗片，老枝黑色，略有光澤。葉互生，革質，橢圓形或闊橢圓形，很少長圓形，長5-10cm，兩端鈍或基部圓形；邊稍反卷或略呈皺波狀，兩面密被銀灰色、少數褐色的鱗片，但老葉上面脫淨； 側脈每邊7-9條，下面不明顯。花秋末開放，白色，1-3朵生於腋生短枝上；花枝長3-5mm，彎垂；花萼外面被鱗片，裡面被星狀毛。管部圓筒狀或稍呈漏斗狀，長5-7mm，下部有深縊痕，其位置與子房頂部近等高，裂片4，三角形，長約3mm，近漸尖；無花瓣；雄蕊4，花絲極短。堅果核果狀，爲肉質的宿萼筒所包裹，橢圓形，長12-14mm，初被褐色鱗片，成熟時紅色。
生長習性：常生向陽山坡、曠野或路旁。
利用部位：葉。
主要成分：根含sitosterol、arjunolic acid、muslinlc acid。
藥　　效：斂肺，平喘，止咳。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈3〉

錫蘭橄欖

編號：TARI-125

中文科名：膽八樹科
英文科名：Elaeocarpaceae
學　　名：*Elaeocarpus serratus* L.
植物特徵：常綠喬木。小枝平滑，具葉痕。葉不規則互生，種子長橢圓形，種皮堅硬，花期6-10月，果期12-2月。
生長習性：錫蘭原產，分布印度、斯里藍卡、南洋各地。
利用部位：根部。
主要成分：含粗脂肪、還原糖、非還原糖、果膠。種仁含油，可作爲食用油或工業用油。
藥　　效：健胃、平肝、潤肺、理氣、祛風止痛。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

毛蓮菜

編號：TARI-126

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Elephantopus mollis* H. B. K.
植物特徵：多年生草本，全株密生白色硬毛，葉互生，葉片長橢圓形，先端銳尖形，鋸齒緣，頭花總狀疏散，頭花皆管狀花，瘦果被短毛。
生長習性：臺灣全境平野至低海拔山區之荒野、路旁、農園。
利用部位：根及全草。
主要成分：毛蓮菜素、去氧毛蓮菜素、異去氧毛蓮菜素、柔毛蓮菜素。

七寸丁豎杇

編號：TARI-127

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Elephantopus scaber* L.
植物特徵：直立草本，高10-50釐米。生於草地上。莖2歧分枝，多少粗糙，有時全株有白色粗毛。基生葉叢生，葉片匙形或長圓狀倒披針形，長12-17釐米，邊緣稍有鈍鋸齒；莖生葉少，極小。夏秋季開花；頭狀花序成束，生於枝頂，有葉狀總苞片3-4片；花紫紅色。瘦果有稜，頂端有4-6枚長而硬的冠毛。
生長習性：全台灣之平地至低海拔山區均可見。
利用部位：全草。
主要成分：含粗脂肪、還原糖、非還原糖、果膠。種仁鮐油，可作爲食用油或工業用油。
藥　　效：健胃、平肝、潤肺、理氣、祛風止痛。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

牛筋草

編號：TARI-128

中文科名：禾本科
英文科名：Gramineae
學　　名：*Eleusine indica*
植物特徵：一年生草本，高15-90cm。鬚根細而密。稈叢生，直立或基部膝曲。葉片條形，扁平或卷折，長達15cm，寬3-5mm，疏生疣狀柔毛，中脈顯著突起，葉稍壓扁，有脊，邊緣近膜質，先端稀具絲狀毛；葉舌長約1mm。夏、秋兩季開花，穗狀花序纖細，淡綠色，長3-10cm，寬3-5mm，2-5花序(少爲2)呈指狀排列於莖頂，有時其中之一單生於其他花序之下，小穗有花3-6朵。種子卵形，有波狀皺紋。
生長習性：生於曠野、路旁。
利用部位：全草。
主要成分：含蛋白質、澱粉、脂肪、少量亞硝酸鹽。
藥　　效：清熱解毒，祛風利濕，散瘀止血。

曇花

編號：TARI-129

中文科名：仙人掌科
英文科名：Cactaceae
學　　名：*Epiphyllum oxypetalum* Haw
植物特徵：多年生肉質灌木；葉革質，基部尖銳，葉緣爲邊緣波狀、鋸齒緣。花著生於葉狀莖上且生於缺刻處，長約30cm，花色白而大。花期爲6-10月，開花時間爲晚上直至清晨。
生長習性：多爲栽培。
利用部位：花、莖。
主要成分：花含異紫柳甘、扇茶酚、槲皮素、楊梅樹皮素等。
藥　　效：清熱、止血。
資料來源：常見中草藥〈4〉

刺芫荽

編號：TARI-130



中文科名：繖形科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Eryngium fortidum*
植物特徵：1年生或多年生草本，株高10-30 cm，主根圓錐形，分佈淺，葉自根出，倒披針形，長5-20cm，寬1-3 cm，葉緣具有波狀鋸齒，齒端有硬刺，基部漸狹，無葉柄。花莖直立而粗壯，高 20-30 cm，2歧分枝，具有疏生尖齒的莖生葉。聚繖花序具3-5回2歧分枝，由數個頭狀花序組成，總苞片5-6片，葉狀，開展且反折，邊緣有1-2對疏生尖刺，小總苞片長2-3mm，花極小，白色或淡綠色，雙懸果球形，種子極小，褐色。
生長習性：喜溫耐熱，在陰坡潮濕的環境中生長茂盛，對土壤的適應性較強。
利用部位：全草。
主要成分：含維他命A、B、C、鈣、鐵。
藥　　效：具有行氣、健胃之效，可治腹脹、消化不良、腸炎腹瀉、感冒胸痛、心臟無力。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑 (1)

雞冠刺桐

編號：TARI-131

中文科名：豆科
英文科名：Papilionaceae
學　　名：*Erythrina crista-galli* Linn.
植物特徵：爲落葉性喬木，葉互生，具長柄，三出複葉。花期在春夏季，總狀花序；花瓣顏色鮮豔，分旗瓣、翼瓣及龍骨瓣，旗瓣倒卵形，與龍骨瓣等長，翼瓣不顯眼。
生長習性：原產地是巴西，喜歡高溫多濕的氣候，任何土壤均能生長。
利用部位：種子及莖皮。
主要成分：刺桐鹼(hypaphorine)及刺桐鹼甲醚。
藥　　效：洗刷廚具、藥用。
資料來源：全國中草藥匯編

藍桉

編號：TARI-132

中文科名：桃金孃科
英文科名：Myrtaceae
學　　名：*Eucalyptus globulus*
植物特徵：常綠大喬木。樹皮粗糙，葉革質互生，披針形，搓揉有香味。秋季開白色花，聚繖花序，蒴果杯形。褐色的厚樹皮，深溝縱裂紋略成旋轉形。
生長習性：原產地澳洲。
利用部位：葉、枝幹。
主要成分：桉葉油素、α-蒎烯水芹烯、莰烯、品醇、乙酸香味醇、香茅醛和胡椒酮等。
藥　　效：樹葉可煉油，樹幹做坑木。
資料來源：全國中草藥匯編

日本衛矛

編號：TARI-133

中文科名：衛矛科
英文科名：Celastraceae
學　　名：*Euonymus japonica* Thunb
植物特徵：常綠灌木。單葉，互生，革質，倒卵形或橢圓形，長3.5-6.5公分，花四數。雄蕊短，著生於花盤上，子房與花盤連生。蒴果扁球形。
生長習性：臺灣及日本原產。
利用部位：樹皮。
藥　　效：樹皮爲杜仲代用品。
資料來源：藥用植物學

綠珊瑚

編號：TARI-134

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Euphobia tirucalli* L
植物特徵：無刺灌木或小喬木，高0.3-5公尺。分枝對生或輪生，圓柱狀；小枝細長，綠色，稍肉質。葉少數，散生於小枝頂部，或退化爲不明顯的鱗片狀；無托葉。杯狀聚傘花序通常有短總花梗，簇生於枝端或枝叉上；總苞陀螺狀，直徑約2mm，內面被柔毛；腺體5無花瓣狀附片；雄花少數，苞片易撕裂，基部多少合生；雌花淡黃白色，子房3室，花柱下部合生，先端短2裂，柱頭頭狀。蒴果直徑6mm，暗黑色，被貼伏的柔毛；種子卵形，平滑。
生長習性：野生，或栽培於庭院、校園、植物園供觀賞。
利用部位：全株。
主要成分：新鮮乳汁含α-香樹脂醇(α-amyrin)，環木菠蘿烯醇，大戟甾醇(euphorbosterol)，大戟因子(euphorbia factor)Ti1～Ti9，其中Ti5爲12-O-[(2Z,4E)-2,4-辛二烯醯基]巴豆醇-13-乙酸酯{12-O-[(2Z.4E)-2,4-octadienoyl]phorbol-13-acetate}，Ti6爲12-O-[(2Z,4Z)-2,4,6-癸三烯醯基]巴豆醇-13-乙酸酯{12-O-[(2Z,4Z)-2,4,6-decatrienoyl]phorbol-13
藥　　效：催乳，殺蟲，解毒。主治產後乳汁不足，癬瘡，關節腫痛。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

霸王鞭

編號：TARI-135

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Euphorbia antiquorum* Linn.
植物特徵：多年生灌木。莖直立，肉質，內含白色乳汁，樹皮粉綠白色，老莖圓柱狀，或鈍三至六角形，小枝具厚而作波浪狀的翅，翅的凹陷處有一對銳刺。單葉互生，肉質，倒卵形，葉面深綠，背面稍淺。聚繖花序，花黃色，單性，無花被。雌雄同株，蒴果球形，花期3-4月。
生長習性：各地作綠籬或庭園零星栽培。
利用部位：莖、葉、花蕊。
主要成分：蒲公英賽醇、蒲公英賽酮、3α-無霸帖醇、3β-無霸帖醇、固醇、黃酮類、糖類、氨基酸、大戟醇、大戟腦。
藥　　效：莖有消腫、通便、殺蟲之效。治急性胃腸炎、腫毒。葉有消積化滯、解毒行瘀之效。治霍亂、跌打積瘀。花蕊解毒消腫。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

大甲草

編號：TARI-136

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Euphorbia formosana* Hay.
植物特徵：半灌木狀多年生草本，莖直立，高約30-150公分，分枝呈繖形狀，集中於莖頂；葉互生或輪生，無柄，線狀披針形，全緣，莖葉折之，可見白色乳汁流出。大戟花序再排列成繖形，腋出或頂生，總苞鐘形，黃色，4裂；子房扁球形，花柱2枚，蒴果成熟後3裂。
生長習性：本省東部台東縣境內較爲常見。
利用部位：全草。
主要成分：新鮮乳汁含α-香樹脂醇(α-amyrin)，環木菠蘿烯醇，大戟甾醇(euphorbosterol)，大戟因子(euphorbia factor)Ti1～Ti9，其中Ti5爲12-O-[(2Z,4E)-2,4-辛二烯醯基]巴豆醇-13-乙酸酯{12-O-[(2Z.4E)-2,4-octadienoyl]phorbol-13-acetate}，Ti6爲12-O-[(2Z,4Z)-2,4,6-癸三烯醯基]巴豆醇-13-乙酸酯{12-O-[(2Z,4Z)-2,4,6-decatrienoyl]phorbol-13-acetate},Ti7爲12-O-(2,4,6,8,10-十四碳五烯醯基)巴豆醇-13-乙酸酯[12-O-(2,4,6,8,10-tetradecapen-taenoyl)phorbol-13-acetate]，Ti8爲12-O-(2,4,6,8-十四碳四烯醯基)巴豆醇-13-乙酸酯[12-O-(2,4,6,8-tetradecatetraenoyl)phorbol-13-acetate]，Ti9爲12-O-乙醯基巴豆醇-13-(2,4,6,8,10-十四碳五烯酸酯[12-O-acetylphorbol-13-(2,4,6,8,10-tetradecapenaenoate)。還含甘油三酯類(triglycerides)，甾醇三帖類(steroidal triterpenes)，二帖酯(diterpene ester)，帖烴類(terpenoidal hydrocarbons)，環綠玉樹烯醇(cyclotirucanenol)也叫24β-甲基-9β-19-環羊毛甾-20-烯-3β-醇(24β-methyl-9β-19-cycloanost-20-en-3bol)等。
藥　　效：根及莖解毒消腫。治蛇傷、疥癬、無名腫毒、疔瘡、瘰疽、皰疹。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

石筆虎尾蘭

編號：TARI-137

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Euphorbia neriifolia* L.
植物特徵：爲多年生肉質植物，能以氣生根攀附於它物上。長可超過8m；莖深綠色，節處收縮，節間3棱柱形，長20-40cm，棱寬1-2.5cm，邊緣稍呈波狀，波谷處具一窩孔，孔內具1-3小刺。葉退化。花大，夏秋季晚上開放，白色，管狀，長達30cm；萼片卡部合生成管狀，上部狹披針形，黃綠色；花瓣下部與萼管合生，上部寬闊；雄蕊多數，著生於花被管內面中部至下部；子房與花被管合生，花柱粗壯，伸出，柱頭多裂。漿果長圓形，長約10cm，成熟時紫紅色，肉質，具卵狀而頂端急尖的鱗片，成熟時近平滑，果肉白色，可食。但台灣的品種並不容易看到果實。
生長習性：攀附於石上、牆上或樹上，河堤或閒置地常有遺人遺棄而自生的族群。
利用部位：肉質莖及花。
主要成分：抗癌生物鹼，根含八仙花酚、八仙花酸、半月苷酸。葉含菌芋甘，花含芸香甘。
藥　　效：止氣痛，理痰火咳嗽。花：清熱，潤肺，止咳。莖：舒筋活絡，解毒。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(2)

大飛揚

編號：TARI-138

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Euphorbia hirta* Linn.
植物特徵：爲一年生草本，高15-40cm，含白色乳汁，常淡紅色或淡紫色，被長硬毛，基部分枝。單葉對生，長圓狀披針形或卵狀披針形，長1-4cm，上面中部常有紫斑，兩面被毛；葉柄長1-2毫米；托葉小，披針形，邊緣剛毛狀撕裂。花序杯狀，多數排列成密集的腋生頭狀花序狀，總花梗長約0.5mm；總苞片鐘狀，外面密被短柔毛，頂4裂，腺體4，有白色花瓣狀附屬物；花夏秋季開放，單性，無花被，雌雄花生於同一總苞內；雌花單生於花序中央；雄花幾朵位於雌花外圍，每花僅1雄蕊。蒴果卵狀三稜形，長1.5mm，被短柔毛。
生長習性：生於田邊、村邊和荒地等向陽處。東南亞地區也有分布。
利用部位：全草。
主要成分：全草含黃酮甘、Xanthorhamnin、Quercetin、三帖類、蒲公英酮、蒲公英醇、沒食子酸、肌醇。
藥　　效：根及莖解毒消腫。治蛇傷、疥癬、無名腫毒、疔瘡、癰疽、皰疹。
資料來源：實用中草藥彩色圖集第二冊

聖誕紅

編號：TARI-139

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch
植物特徵：中性植物，生長快速，耐熱也耐寒，花期10-4月。落葉灌木，高1-4公尺，亦有矮性及不同花色的園藝品種，嫩莖草質，綠色，老莖木質中空；葉盾形或披針形，葉側緣微凹；具艷色似花的部份實爲其苞葉。
生長習性：庭栽，盆栽觀賞，綠籬。
利用部位：全株。
主要成分：植物甾醇、β-香樹脂、β-香樹脂乙酸、豆甾醇。
藥　　效：調經止血、接骨消腫。
資料來源：常見中草藥 (6)

崖椒(雙面刺)

編號：TARI-140

中文科名：芸香科
英文科名：Rutaceae
學　　名：*Fagara nitida* Roxb.
植物特徵：攀緣灌木。枝條上有倒勾刺。葉呈羽狀複葉，橢圓形，它的名字便是因葉中肋兩面都長有暗紫紅色的刺而來，不過有些植株只在葉背面有刺。葉肉有油點。花序總狀，淡黃白色而有清。果實球形，很小，直徑只有0.5公分左右，成熟時黑色，有麻辣味。
生長習性：生長在亞熱帶闊葉林下部。
利用部位：全草。
主要成分：根含dictamnine，skimmianine，nitidine，xanthyletin，laurifolie。木部含flavianate，trilobine，magnoflorine，laurifoline，葉含精油、樹脂及酚類。
藥　　效：能消腫解毒、舒經活血止痛、祛風消炎止癢。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈上〉

榕

編號：TARI-141

中文科名：桑科
英文科名：Moraceae
學　　名：*Ficus microcrpa* L.
植物特徵：常綠大喬木。多分枝而擴散呈傘狀，故人類喜栽培作庇蔭樹，成樹後常由樹幹或粗枝生多數氣根，若著地則漸粗壯成為支柱狀，樹皮及嫩枝葉含白色乳汁。花果期5–10月。
生長習性：中國大陸南部，東南亞熱帶各地，印度，日本，琉球。
利用部位：鬚、皮、葉、果、乳汁均曬乾使用。
主要成分：氣根含酚類，氨基酸，有機酸，糖類。葉含三帖皂甘，黃酮甘，酸性樹脂，鞣質。
藥　　效：祛風清熱、活血散瘀、解毒消腫、止痛、殺蟲
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉

牛乳房

編號：TARI-142

中文科名：桑科
英文科名：Moraceae
學　　名：*Ficus formosana* Maxim.
植物特徵：灌木，高2–3m。小枝、葉脈和葉柄幼時均被疏柔毛；枝纖細，有托葉殘留的痕跡。葉互生；葉柄長4–6mm；托葉長三角形，長約8mm，早落；葉片膜質，倒卵狀披針形，長4–11cm，寬1–3.5cm，先端通常漸尖，尖端有時長達1cm以上，中部以下漸狹，有時不對稱，基部楔形，全緣或上部呈淺波狀或有不規則的缺齒；側脈和疏離的網脈在背面稍明顯。隱頭花序(榕果)單生於葉腋，梨形或近球形，成熟時紫紅色，直徑6–8mm，外面有小瘤體，頂端有臍狀突起，基部漸狹成一短柄，長2–3mm；雄花、癭花同生於一花序托中，雌花生在另一花序托內；雄花花被片3–4，雄蕊2；癭花花被片4–5，舟狀，花柱短，側生；雌花與癭花相似，花被片4，但花柱較長，柱頭漏斗形。瘦果。花期4–7月。
生長習性：生於低海拔至高海拔的山地疏林中或曠野、路旁、溪邊。
利用部位：全株。
主要成分：含單寧酸、草酸、鈣、鉀鹽、穀胱甘肽等。果實含果糖、草酸鹽等。
藥　　效：活血補血，催乳，止咳，祛風利濕，清熱解毒。
資料來源：中華草本 (5)

天仙果

編號：TARI-143

中文科名：桑科
英文科名：Moraceae
學　　名：*Ficus formosana* Maxim.
植物特徵：灌木，高2-3m。小枝、葉脈和葉柄幼時均被疏柔毛；枝纖細，有托葉殘留的痕跡。葉互生；葉柄長4-6mm；托葉長三角形，長約8mm，早落；葉片膜質，倒卵狀披針形，長4-11cm，寬1-3.5cm，先端通常漸尖，尖端有時長達1cm以上，中部以下漸狹，有時不對稱，基部楔形，全緣或上部呈淺波狀或有不規則的缺齒；側脈和疏離的網脈在背面稍明顯。隱頭花序(榕果)單生於葉腋，梨形或近球形，成熟時紫紅色，直徑6-8mm，外面有小瘤體，頂端有臍狀突起，基部漸狹成一短柄，長2-3mm；雄花、癭花同生於一花序托中，雌花生在另一花序托內；雄花花被片3-4，雄蕊2；癭花花被片4-5，舟狀，花柱短，側生；雌花與癭花相似，花被片4，但花柱較長，柱頭漏斗形。瘦果。花期4-7月。
生長習性：生於低海拔至高海拔的山地疏林中或曠野、路旁、溪邊。
利用部位：全株。
主要成分：鬼臼毒素、苦鬼臼毒素、異苦鬼臼毒素、山柰酚、槲皮素、紫雲英甘等。
藥　　效：活血補血，催乳，止咳，祛風利濕，清熱解毒。
資料來源：全國中草藥匯編

大葉榕

編號：TARI-144

中文科名：桑科
英文科名：Moraceae
學　　名：*Ficus microcarpa*
植物特徵：常綠大喬木。多分枝而擴散呈傘狀，故人類喜栽培作庇蔭樹，成樹後常由樹幹或粗枝生多數氣根，若著地則漸粗壯成爲支柱狀，樹皮及嫩枝葉含白色乳汁。花果期5-10月。
生長習性：中國大陸南部，東南亞熱帶各地，印度，日本，琉球。
利用部位：鬚、皮、葉、果、乳汁均曬乾使用。
主要成分：氣根含酚類，氨基酸，有機酸，糖類。葉含三帖皂甘，黃酮甘，酸性樹脂，鞣質。
藥　　效：祛風清熱、活血散瘀、解毒消腫、止痛、殺蟲。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉

雀榕

編號：TARI-145

中文科名：桑科
英文科名：Moraceae
學　　名：*Ficus wightiana* Wall.
植物特徵：落葉大喬木。葉互生，叢生於枝端，橢圓形。葉鈍、短突尖，全緣，紙質，羽狀側脈，正面綠，新葉紅褐色，背面淺綠，有柄，單葉。花序球形，花期3-8月，單性花、具短梗、單生或對生於枝幹上，雄花、雌花、癭花同生於一隱頭花序內壁，隱花果(無花果)，小果瘦果，扁球形徑 1-1.5公分，果期6-8月。
生長習性：中國大陸南部、中南半島、東南亞、日本、台灣。
利用部位：葉。
主要成分：氣根含酚類，氨基酸，有機酸，糖類。葉含三帖皂甘，黃酮甘，酸性樹脂，鞣質。
藥　　效：祛風清熱、活血散瘀、解毒消腫、止痛、殺蟲
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉

白飯樹

編號：TARI-146

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Flueggea virosa (Roxb. ex. Willd.)* Voigt
植物特徵：落葉灌木，高2-4m，全體無毛。莖皮紅褐色，嫩枝有稜。單葉互生；葉柄長 3-6mm；葉片近革質，長圓狀倒卵形至橢圓形，長1-5cm，寬1-3.5cm，先端鈍圓而有極小的凸尖，基部楔形，邊緣全緣，上面綠色，下面蒼白色。夏末秋初開開小的淡黃色花，直徑 2-2.5mm，成稠密腋生的花叢，花梗極短；萼圓形或矩圓形；無花瓣；雄蕊5個，突出；子房卵圓形，花柱3，2裂。果肉質，球形，直徑約3mm，熟時白色，有種子3-6粒。
生長習性：生於河邊、坡地、灌木叢中或疏林下。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼白飯樹鹼(fluggein，$C_{10}H_{15}ON$)。
藥　　效：清熱解毒，消腫止痛，止癢止血。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

四季橘

編號：TARI-147

中文科名：芸香科
英文科名：Rutaceae
學　　名：*Fortunella crassifolia* Swingle
植物特徵：常綠灌木至小喬木。高1-2公尺。枝幹具短棘刺或針刺。小枝細長，綠色。葉對生，具短柄，有狹翼。葉片革質，長橢圓形。種子橢圓形。花期4-5月，果期10-1月。
生長習性：各地栽培。
利用部位：根、葉、果實、種子。
主要成分：揮發油、維生素C、丁香甘等。
藥　　效：理氣，解鬱，化痰，醒酒。主治氣鬱不舒，胸腺病悶，食滯納呆，傷酒口渴，咳嗽咯痰等病症。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

光蠟樹

編號：TARI-148

中文科名：木樨科
英文科名：Oleaceae
學　　名：*Fraxinus formosana* Hayata
植物特徵：半落葉喬木，成株高可達20公尺。葉對生、革質，奇數羽狀複葉，小葉卵形或長橢圓形，先端銳尖。翅果長線形，先端凹。
生長習性：全省低海拔闊葉林中，以溪岸最多。
利用部位：木材。
主要成分：樹脂成分。
藥　　效：主治氣郁不舒，胸腺病悶，食滯納呆，傷酒口渴，咳嗽咯痰等病症。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

椬梧

編號：TARI-149

中文科名：胡頹科
英文科名：Elaeagnaceae
學　　名：*Elaeagnus oldhami* Maxim.
植物特徵：常綠半蔓性灌木至小喬木，具長棘刺，嫩枝散生紅棕色星狀鱗片物。葉互生，花1枚或2數枚簇生成總狀花序。果實核果狀，圓形至橢圓形，熟紅。
生長習性：喜好生長在開闊的河床、山壁、 岩洞及濱海乾旱地。
利用部位：根和莖。
主要成分：根含sitosterol、arjunolic acid、muslinlc acid。
藥　　效：祛風除濕、散瘀消腫、固腎平喘之效。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (3)

白珠樹

編號：TARI-150

中文科名：杜鵑花科
英文科名：Ericaceae
學　　名：*Gaultheria leucocarpa* f. var. *cuming* (Vidal) Sleumer
植物特徵：常綠小灌木，高約100-150公分，枝細長帶紫紅色，葉互生，革質，葉片卵形或卵狀批針形。總狀花序，腋生，花冠鐘形，白色或乳黃色，花後萼發育成漿果狀肥厚包住果實，熟時暗紅色至紫黑色。種子多數。
生長習性：臺灣全境海拔600-3000m 間，尤以中海拔地區之路旁、灌叢中多見。
利用部位：全草。
主要成分：葉含冬綠甘。
藥　　效：全草有祛風陰濕、疏筋通絡、活血止痛之效。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(3)



小駁骨丹

編號：TARI-151

中文科名：爵床科
英文科名：Acanthaceae
學　　名：*Gendarussa vulgaris* Nees
植物特徵：常綠小灌木，高達1.5m。莖直立，多分枝，小枝有四稜線，莖節膨大，略帶紫色，無毛。葉對生，具短柄，披針形，長4-14cm，寬 1-2cm，先端漸尖，基部楔形，全緣，上面青綠色，下面黃綠色，光亮。初夏開花，穗狀花序頂生或生於上部葉腋內，長4-10 cm，有時分枝，花簇生，下部花束常疏離；內外兩對苞片都小而窄；花冠二唇形，白色或粉紅色，有紫斑；雄蕊2個。蒴果棒狀，無毛。
生長習性：生於溝谷、山坡林陰濕處或栽培於屋邊、園邊肥沃地。
利用部位：全株。
主要成分：葉、嫩枝、樹皮及根含有生物鹼。
藥　　效：主治跌打損傷，骨折，扭挫傷，風濕性關節炎、感冒、月經不調。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑（1）

青脆枝

編號：TARI-152

中文科名：茶茱萸科
英文科名：Lcacinaceae
學　　名：*Nothapadytes foetida* (Wight)Sleum
植物特徵：常綠灌木至小喬木，幼枝淡黃綠色，葉互生，葉片卵狀橢圓形至長橢圓形，花頂生，聚繖花序，花白色或淡黃色，果期夏至秋間，果實爲長橢圓形，果實未熟時呈綠色，成熟時爲黑色。
生長習性：屬熱帶及亞熱帶珊瑚礁岩風化土壤區之特植物，其最適合的土壤爲PH6.5以上之中性排水良好有機質含量高之砂壤土或石礫壤土。
利用部位：莖、根或根皮。
主要成分：喜樹鹼（camptothecin）
藥　　效：有祛風除濕、理氣散寒、抗癌之效。
資料來源：全國中草匯編

金錢薄荷

編號：TARI-153

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Glechoma longituba* (Nakai) Kupr.
植物特徵：多年生匍匐草本，高5-20公分。莖細長，四稜形，有分枝，節著地生根，枝梢直立，被短柔毛。葉對生，有柄；葉片圓形或腎形，長 1-3公分，寬1.5-3公分，基部心形，邊緣有圓齒，兩面脈上均有短柔毛。春、夏開花，輪傘花序腋生，每輪有花2-6朵。苞片鑽形，頂端有芒。花萼筒狀，長約8-10mm，有5齒，齒端有芒，外面和齒緣上均有白色細毛；花冠二唇形，紫紅色或淡紫色，長1.2-2公分，冠管細，向喉部增廣，上唇短，倒心形，頂端有深凹，下唇有3裂片，側裂橢圓形，中裂最大，倒心形，頂端有凹；雄蕊4，花絲頂端分2枝，其中1枝著生花藥，藥室叉開成直角；花柱光滑，柱頭2裂。小堅果長圓形，褐色。
生長習性：喜生於潮濕蔭蔽的溝邊、山野、草叢及林緣。
利用部位：全草。
主要成分：莖、葉含揮發油。油中主要成分爲1-松莰酮(1-pinocamphone,C10H16O)，尚含1-薄荷酮(1-menthone,C10H18O)、α-蒎烯(α-pinene,C10H16)、β-蒎烯(β-pinene)、檸檬烯(limonene,C10H16)、1,8-桉油精(1,8-cineol,C10H18O)、對-傘花烴(p-cymene,C10H14)等，成分隨產地、生境而有所差異。其它，尚含有水蘇糖、熊果酸、膽鹼、鞣質及無機鹽等。
藥　　效：清熱解毒，利尿排石，散瘀消腫。
資料來源：藥用植物學

甘草

編號：TARI-154

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Glycyrrhiz uralensis* Fisch
植物特徵：多年生草本，高約30-70cm。根莖圓柱狀，主根甚長，粗大，外皮紅核色至暗核色。莖直立，稍帶木質，被白色短毛及腺鱗或腺狀毛。單數羽狀複葉，總狀花序腋生，花密集，莢果線狀長圓形，花期6-7月，果期7-9月。
生長習性：生於向陽乾燥的鈣質草原、河岸砂質土。
利用部位：塊狀莖。
主要成分：甘草甜素、甘草次酸、甘草素。
藥　　效：補中益氣、祛痰止咳、清熱解毒。
資料來源：中藥大辭典(上)

鼠麴舅

編號：TARI-155

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Gnaphalium purpureum* L.
植物特徵：一年生草本。株高約10-30cm，莖基部有多數分枝，斜上生長；葉片舌狀，兩面均被有絨毛；頭狀花淡褐色，細小而不顯眼，開放於葉腋或莖頂，無舌狀花；瘦果細小，表面有突起物，冠毛一列，淡白色。
生長習性：臺灣全境平野普遍多見群生。
利用部位：全草。
主要成分：甘草甜素、甘草次酸、甘草素。
藥　　效：全株搗碎可外敷腫毒；全草煮汁飲服，具有清涼、降火及利尿等功效。
資料來源：中藥大辭典(上)

奶葉藤

編號：TARI-156

中文科名：蕁麻科
英文科名：Urticaceae
學　　名：*Gonostegia hirta* (Blume) Miquel
植物特徵：呈匍匐狀亞灌木或多年生草本植物，對生紙質的葉子爲卵形或披針形；葉柄極短或幾乎無柄。雌雄異花同株，都爲腋生且密集成簇的聚繖花序；卵狀的瘦果極小，約1.5公釐長。
生長習性：全島低海拔地區常見的野草。
利用部位：全草。
藥　　效：全株搗碎可外敷腫毒；全草煮汁飲服，具有清涼、降火及利尿等功效。
資料來源：全國中草藥匯編

墨水樹

編號：TARI-157

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Haematoxylon campechianum* Linn.
植物特徵：落葉小喬木。樹幹灰褐色，具縱溝，葉腋生銳刺，小枝曲折狀，托葉線形。葉爲偶數羽狀覆葉，對生，葉片倒心形或卵形，基部契形，具短炳或無炳。花腋生，總狀花序，黃色。花瓣倒卵狀披針形，基部被白絨毛。莢果扁橢圓形，種子扁腎臟形，黃褐色或淡綠褐色。花期2-4月，果期5-7月。
生長習性：台灣南部墾丁公園栽培。
利用部位：樹幹。
主要成分：心材含墨水樹素。
藥　　效：根或莖有收斂之效。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(1)

白花蛇舌草

編號：TARI-158

中文科名：茜草科
英文科名：Rubiaceae
學　　名：*Hedyotis diffusa* Wilid.
植物特徵：一年生披散草本，高5-20cm。根圓柱狀，白色，細長，分枝，徑1-2mm，粗者往往具橫的溝紋。莖略帶方形或扁圓柱形，光滑無毛，自基部分枝。葉對生，無柄；葉片線形至線狀披針形，長1-3.5cm，寬1-3mm，先端急尖，下面有時粗糙，無側脈；托葉膜質，基部合生成鞘狀，長1-2mm，頂端芒尖。花單生或成對生於葉腋，常具短而略粗的花梗，稀無梗；萼筒球形，直徑1.5mm，4裂，裂片矩圓狀披針形，長1.5-2mm，邊緣具睫毛；花冠白色， 漏斗形，長3.5-4mm，頂端4深裂；裂片卵狀矩圓形，長約2mm，禿淨；雄蕊4，著生於冠筒喉部，與花冠裂片互生，花絲扁，花藥卵形，背著，2室，縱裂；子房下位，2室，花柱線狀，柱頭2淺裂呈半球狀，長於花柱。蒴果扁球形，直徑2-2.5mm，室背開裂，花萼宿存。種子棕黃色，細小，有 3個稜角。花期7-9月，果期8-10月。
生長習性：生長曠野田間、路旁、溝邊、草地。
利用部位：全草。
主要成分：全草含熊果酸，齊墩果酸，對香豆酸，豆甾醇，β-谷甾醇(β-sitosterol)、β-谷甾醇-D-葡萄糖，三十一烷、黃酮及白花蛇舌草素。
藥　　效：清熱解毒、利尿消腫，活血止痛。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

萱草

編號：TARI-159

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Hemerocallis fulva* Linn.
植物特徵：多年生草木。根狀莖短。花期6–8月，果期7–9月。
生長習性：生於山坡、草地或林緣。
利用部位：根及根莖。
主要成分：黃花菜根含多種蒽醌類化合物。
藥　　效：有利消腫、清熱利溼、消炎。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈下〉

月桂

編號：TARI-160

中文科名：樟科
英文科名：Lauraceae
學　　名：Laurus nobilis L.
植物特徵：常綠小喬木或大灌木，高達12米。樹冠卵形，小枝綠色。單葉互生，革質，長橢圓形至廣披針形，端漸尖，全緣，常帶波狀，兩面無毛，羽狀脈，表面暗綠色，有光澤，揉碎有香味，葉柄紫色。雌雄異株，花黃色，小。果橢圓狀球形，熟時暗紫色。花期4月；果熟期9-10月。
生長習性：原產地中海一帶，我國早在唐以前就引種栽培，分佈于長江流域以南地區。在本地區散見於各園林、私宅及學校、工廠等，大多爲上世紀80年代前栽種的。目前尚未充分開發利用。
利用部位：樹皮及樹枝。
主要成分：桉葉素、丁香酚、蒎稀、水芹稀、芳樟醇、香葉醇及乙烯丁香酚。
藥　　效：葉可以減輕扭傷、瘀青和風濕所引起的疼痛。
資料來源：中草藥匯編

朱槿

編號：TARI-161

中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Hibiscus rosa-sinensis* L.
植物特徵：常綠灌木，直立多莖多分枝，葉深綠，有光澤，花白、紅、粉紅、黃、橘色、單辦或重辦，全年開花，盛花期爲5-10月，樹性極強健，可單植，列植，群植。
生長習性：公園、庭園、綠地美化。
利用部位：根、葉、花、根幹皮。
主要成分：花含肥皂草甘(saponarin)係爲一種黃酮甘，並含異牡荊素 (isoxitexin爲比喃葡萄糖基芥菜素)和反丁烯二酸。此外，尚含有皂甘及多量粘液質。皮含壬二酸、辛二酸、二十八醇-1，β-谷甾醇、二十二碳二醇、白樺脂醇、古柯三醇等。根皮含鞣質及粘液質。種子含錦葵酸(malvalic acid)、蘋婆酸(sterculic acid)、二氫蘋婆酸(dihydrosterculic acid)。
藥　　效：根有解毒、調經、通便之效。葉有消腫、止血之效。花有清肺、化痰、涼血、解毒、調經之效。根幹皮有調經、通便、止咳、消炎之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑 (3)

洛神葵

編號：TARI-162

中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Hibiscus sabdariffa* L.
植物特徵：1年生木質狀草本，株高1-2m，莖淡紫色至紅紫色，被疏粗毛，葉互生，裂片披針形，兩面無毛，花冠黃色，中心部紫黑色，蒴果卵球形，種子多數腎形。
生長習性：各地庭園或藩籬普遍觀賞種植。
利用部位：根、花萼、花冠及種子
主要成分：花含棉花色素、槲皮素。萼含糖類、粗蛋白質、粗脂肪、碳水化合物。果膠，內含果膠酸、檸檬酸。種子含油類及擬蛋白。
藥　　效：根有強壯、輕瀉作用。花萼有清熱、解渴、止咳、降血壓之效。治中暑、咳嗽、酒醉、高血壓。種子有強壯、利尿、輕瀉之效。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑 (3)

山芙蓉

編號：TARI-163

中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Hibiscus taiwanensis* S. Y. Hu
植物特徵：灌木或小喬木，分佈於平地山麓。全株密生柔毛，葉片紙質三至五淺裂。花具長梗，白色或粉紅色花蕊黃色，花朵直徑可達十公分，花期在秋冬季。
生長習性：臺灣全境平野、山麓至海拔1200公尺間闊葉林內。
利用部位：根及粗莖。
主要成分：黃酮甘、酚類、氨基酸、還原糖、黏液質。
藥　　效：清熱解毒，消炎止痛，消腫排膿，清肺涼血。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑 (2)

猿尾藤

編號：TARI-164

中文科名：黃褥花科
英文科名：Malpighiahiaceae
學　　名：*Hiptage benghalensis* (L.) Kurz
植物特徵：常綠蔓性藤本，葉對生，總狀花序，花黃白，瓣緣細裂，果具3翅。
生長習性：臺灣、印、馬。
利用部位：根、樹皮及葉。
主要成分：根皮含猿尾藤甘
藥　　效：根、樹皮及葉有清熱、解毒、鎮咳、散瘀、消腫止血，催吐之效。治感冒發熱、咳嗽、支氣管炎、木薯中毒等。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(一)

金針

編號：TARI-165

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Hemerocallis fulva* L.
植物特徵：多年生草本。根狀莖粗短，具肉質紡錘狀塊根。葉基生，條狀披針形，長30-60cm，寬約2.5cm，背面被白粉。花葶圓柱形，高達100cm；圓錐花序頂生，具花5-6朵；苞片小，披針形；花被橙色或橙紅色，下部成管，上部裂片6，2 輪，內輪裂片較外輪爲寬，中部有暗紅色斑紋，邊緣稍作波狀；雄蕊6，花絲長，著生於花被喉部；子房上位。蒴果矩圓形。花期6-8月，果期8-9月。
生長習性：生於山地濕潤處。
利用部位：全草。
主要成分：含有生物鹼。
藥　　效：清熱利尿、涼血止血。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(1)

魚腥草

編號：TARI-166

中文科名：三白草科
英文科名：Saururaceae
學　　名：*Houttuynia cordata* Thunb.
植物特徵：多年生草本。全株有腥臭味，莖下部伏地。節上生根，上部直立，莖葉常帶紫紅色。單葉互生；葉心形或寬卵形，全緣，下面常有紫紅色，有腺點，具緣毛。穗狀花序頂生，長圓狀或倒卵形，白色。蒴果卵形。花期6-7月，果期8-9月。
生長習性：生於陰山地，溝邊，塘邊，田埂或林下濕地。
利用部位：莖、葉、花穗。
主要成分：揮發油、月桂烯、石竹烯、阿福豆甘、全絲桃甘、綠原酸、豆甾醇等。
藥　　效：抗菌、抗菌毒作用、利尿作用、增強機體免疫功能、鎮痛止咳、止血等作用。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(上)

山香

編號：TARI-167

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Hyptis suaveolens* (L.) Poir.
植物特徵：一年生草本，高0.5-2m。莖直立，粗壯，分枝，多少被平展剛毛，揉之有香氣。單葉對生，荷葉柄，柄長0.5-6cm，被平展剛毛；葉片薄紙質，卵形，長4-11cm，寬1.2～9cm，愈向上部的愈小，先端略鈍，基部渾圓或淺心形，邊緣有小鋸齒，兩面均被疏柔毛。夏秋季開花，腋生，聚傘花序有花2-4朵，於枝上排列成假總狀或圓錐狀花序，無花梗或花單生而具短花梗；萼花花時長約4-5mm，但很快就長大而長達1-1.2cm，有10脈，極隆起，被長柔毛及內色腺點，5個裂齒錐尖，直立；花冠二唇形，藍色，長6-8mm，上唇2圓裂，裂片外反，下唇3裂，側裂片與上唇裂片相似，中裂片囊狀。雄蕊4，下傾。果期秋冬季，小堅果矩圓形，扁平，暗褐色，具細點。
生長習性：種子繁殖，喜歡陽光充足的地方，台灣中部山區有大量栽培採收種子，供山粉圓用。
利用部位：全草及種子。
主要成分：揮發油。
藥　　效：疏風利濕，行氣散瘀。種子：甘涼，清熱利濕，解毒。
資料來源：全國中草藥匯編

牛膝草

編號：TARI-168

中文科名：唇形花科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Hyssopus officinalis* L.
植物特徵：莖直立，葉片狹小，花朵呈唇形狀；全株有特殊的香氣；多年生草本植物，高約 50-50公分；直立，基部分枝性佳；葉對生呈披針形，因像柳葉，故又稱「柳薄荷」；嫩葉帶有薄荷苦甜參半的香味；紫青色花穗，花期長，花可食用；對蜂鳥、蜜蜂和蝴亦頗具吸引力。
生長習性：生於山坡林下。
利用部位：全草。
主要成分：含揮發油。
藥　　效：用以疏通筋骨、恢復元氣，可用於氣血虛弱者，並可提高血壓與關節痠痛按摩。
資料來源：藥用植物圖鑑

非洲鳳仙花

編號：TARI-169

中文科名：鳳仙花科
英文科名：Balsaminaceae
學　　名：*Impatiens balsamina* L.
植物特徵：一年生草本，高60-80cm。莖直立，肉質，圓柱形，上部分枝，下部的節常膨大，表面有短柔毛或近乎光滑，常呈紫紅色，多汁。單葉互生；具柄，柄兩側有腺體數個，紫紅色；葉片窄披針形，長5-15cm，寬1.2-2.5cm，先端長尖，基部楔形而下延，邊緣有疏鋸齒，上面綠色，略有毛，下面毛較多。夏季開白色、淡紅、深紅、或紫紅色花，常1-3朵生於葉腋，亦有2-3朵生於一總軸上，花梗常向下垂；萼片3，側生2片較小，下方1片最大而呈囊狀，基部有向下彎曲的距。蒴果橢圓形，尖頭，被粗毛，成熟時果瓣裂開，急劇旋轉，彈出種子。種子呈扁圓形或卵圓形，少數略有稜角，直徑1.5-3mm，外表面棕褐色，在擴大鏡下可見表面有多數棕色小突點及少數白色成簇的短絨毛散在。
生長習性：宅旁、庭院、路邊等空地種植，種子繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：種子(急性子)：含皂甘、脂防油，油中含鳳仙甾醇(balsaminasterol，C27H800)、杷荏酸(parinaric acid,C17H2802)、α-菠菜甾醇(α-spinasterol)及β-穀甾醇。此外，又含皂甘、揮發油、蛋白質、氨基酸及多聚糖。花：黃酮類化合物：山奈醇(kaempferol)及槲皮素(quercetin)。全草(透骨草)：鳳仙地上部分含指甲花醯、指甲花醒甲醚和槲草素：全草含羥基苯甲酸、芥子酸、咖啡酸；莖含天絲葵素、矢車菊素、飛燕草素、蹄紋天蘭素、錦葵花素、山奈酚、蛋白質。
藥　　效：活血通經，祛風止痛，外用解毒。
資料來源：中藥大辭典(上)

白茅

編號：TARI-170

中文科名：禾本科
英文科名：Gramineae
學　　名：*Imperata cylindrical* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb.ex Hubb & Vaughan
植物特徵：多年生草本，地下莖十分發達，長而多節，黃白色；稈叢生，高約30- 80cm；葉狹長，線形，葉舌膜質，葉緣粗糙；花序爲緊縮的圓錐花序，整個呈穗狀，長約6-18cm，密生長絲狀毛；每朵小花有雄蕊1-2枚，花柱2枚；穎果長橢圓形。
生長習性：台灣低海拔山區、平地尤其是海濱。
利用部位：嫩芽、嫩莖、嫩花穗及地下莖。
主要成分：含甘露醇、果糖、葡萄糖、蔗糖、檸檬酸、蘋果酸、鉀鹽等。
藥　　效：有利尿、解濕之功。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

木藍

編號：TARI-171

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Indigofera tinctoria* Linn.
植物特徵：直立灌木，高40-60cm，小枝被銀白色短毛，單數羽狀複葉，互生，總狀花序，疏鬆，近無梗，花冠蝶形，花黃色，旗瓣圓形至矩形。
生長習性：野生或栽培。
利用部位：葉和莖。
主要成分：全草含靛甘，水解後成份再氧化成靛藍。
藥　　效：清熱解毒、涼血止血。
資料來源：中華本草 (4)

板藍根

編號：TARI-172

中文科名：十字花科
英文科名：Cruciferae
學　　名：*Isatis indigotica* Fort.
植物特徵：二年生草本，主根深長，外皮淺黃棕色。莖直立，上部多分枝。葉互生，基生葉較大，具柄，葉片長圓狀橢圓形，全緣或波狀，有時呈不規則齒裂，莖生葉長圓形至長圓狀倒披針形；闊總狀花序，花梗細長，長角果，花期5月，果期6月。
生長習性：分布於我國華北及陝西、山東等地。
利用部位：根、根莖。
主要成分：indoyl-β-glucoside、β-穀甾醇、靛紅、板藍根乙素($C_5H_7NO_3$)、板藍根丙素($C_{26}H_{48}O_{16}$)、板藍根丁素($C_{18}H_{30}O_{10}$)、植物蛋白、樹脂狀物、糖類。根中含精氨酸、穀氨酸、酪氨酸。
藥　　效：味苦，性寒。有清熱解毒、涼血的功能。用於溫熱發熱、發熱感冒、咽喉腫爛。
資料來源：中國本草彩色圖鑑(上)

兔兒菜

編號：TARI-173

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai
植物特徵：多年生草本，高10-40cm。全株無毛，折之則流出白乳汁。基生葉蓮座狀，條狀披針形或倒披針形，長7-11cm， 寬1-2cm，先端鈍或急尖，基部下建成窄葉柄，全緣或具疏小齒或不規則羽裂；莖生葉1-2枚，無葉柄，稍抱莖，頂端之葉抱莖。頭狀花序排成傘房狀聚傘花序；總苞長7-9mm，外層總苞片卵形，內層總苞片條狀披針形；舌狀花黃色或白色，長10-12mm，先端5齒裂。瘦果狹披針形，稍扁平，紅棕色，長45mm，喙長約2mm，冠毛白色。全草具苦味。生山地及荒野，爲田間雜草。
生長習性：全台各地平野皆有。
利用部位：全草或根。
藥　　效：清熱解毒，消腫排膿，涼血止血。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (2)

黃槿

編號：TARI-174

中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Hibiscus tiliaceus* L.
植物特徵：常綠大喬木，高可達4-7公尺。葉子大呈心形，有長柄；花黃色，花冠 鐘形，蒴果。鄉間其葉做爲包裹糕餅之用，故又名「糕仔樹」。花腋生或頂生，有時作繖狀花序，花梗有時附生一對苞片，花冠鐘形，黃 色，喉暗紅。朔果闊卵形，被粗毛 。全年能開花，至秋季爲主，約3月上旬至5月下旬、7月中旬至9月上旬開花較多。
生長習性：熱帶海濱。
利用部位：根、葉、花、果。
主要成分：黃酮甘、酚類、氨基酸、還原糖、黏液質。
藥　　效：根、樹皮及葉有清熱、解毒、鎮咳、散瘀、消腫止血，催吐之效。治感冒發熱、咳嗽、支氣管炎、木薯中毒等。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(4)

山素英

編號：TARI-175

中文科名：木犀科
英文科名：Oleaceae
學　　名：*Jasminum hemsleyi* Yamamoto
植物特徵：爲常綠纏繞藤木。全株光滑或略有毛。單葉，對生，紙質，具短柄，葉卵狀長橢圓形至卵狀披針形，先端漸尖，長 2.5-5公分，脈三出或五出。花白，花冠筒細長，花冠裂片約6-9片，細長，排成圓盤形。球形漿果，熟黑。
生長習性：台灣產在全島中、低海拔原野、山麓。
利用部位：花、全草。
藥　　效：清熱解毒，消腫排膿，涼血止血。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (2)

茉莉

編號：TARI-176

中文科名：木犀科
英文科名：Oleaceae
學　　名：*Jasminum sambac* Ait.
植物特徵：常綠亞蔓狀灌木。幼枝無毛或被柔毛。葉對生，具短柄，葉片寬卵形、橢圓形或倒卵形，長3-8cm，寬2.5-5cm，基部楔形或心形，先端鈍形或突尖，全緣，兩面無毛或偶脈上有毛。聚繖花序， 頂生或腋生，3-多朵聚生。
生長習性：各地普遍作觀賞或香料作物栽培。
利用部位：根。
主要成分：根含生物鹼，固醇。花含精油。內含苯甲醇及酯類。
藥　　效：根有麻醉，止痛之效。葉有清熱，解表，利濕之效。茉莉花露有理氣，健脾，美容之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

龍柏

編號：TARI-177

中文科名：柏科
英文科名：Cupressaceae
學　　名：*Juniperus chinensis L.* var. *kaizuca* Hort.
植物特徵：常綠灌木至喬木，樹姿呈細尖塔形，主幹常旋轉；葉幾乎全爲鱗片狀，少數爲針狀葉；毬果藍綠色，肉質，略被蠟粉，熟時不開裂。
生長習性：全境公園、庭園普遍栽培之園景樹。
利用部位：根或枝幹、細枝葉。
主要成分：含雪松醇、柳杉酚、陶塔酚及山達海松酸。
藥　　效：根及枝幹有祛風除濕、消腫止痛之效。
資料來源：原色台灣藥用植物(4)

南五味

編號：TARI-178

中文科名：木蘭科
英文科名：Magnoliaceae
學　　名：*Kadsura japonica* (Linn.) Dunal
植物特徵：常綠藤本，植株無毛，葉片橢圓形或橢圓形狀披針形。花乳黃色或淡黃白色，漿果成熟時紫紅色，多數聚集於花托成頭狀。種子腎形，乳黃色。
生長習性：臺灣全境山麓至低海拔山區之濕潤灌叢中或疏林內。
利用部位：藤部。
主要成分：藤含kadsuric acid、kadsurin。果實含germacrene。
藥　　效：藤有解熱止渴、舒筋、活血、解毒之效。治頭痛、腹痛、胃炎、中暑、糖尿病、毒蛇咬傷。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈3〉

山奈

編號：TARI-179

中文科名：薑科
英文科名：Zingiberaceae
學　　名：*Kaempferia galanga* L.
植物特徵：多年生宿根草本。根狀莖塊狀，具芳香。葉2-4片簇生，幾無柄，具葉鞘，常貼近地面，葉片近圓形或廣卵形，基部鈍圓形，全緣或略微波緣，背面疏生長柔毛。乾燥葉面呈紅色小點。花6-12朵頂生莖上，半藏於葉鞘內，陸續單頂朵開放，花白色，瓣片基部常具紫色條斑紋，有香味，易凋謝。子房下位，具2枚棒狀附屬體，花柱細長，柱頭盤狀。蒴果。花果期6-10月。

生長習性：各地零星觀賞栽培。
利用部位：全株。
主要成分：揮發油，桉油素，龍腦，桂皮酸乙酯，山奈酚，山奈素，黃酮類，香豆素，蛋白質，澱粉，粘液質等。
藥　　效：有溫中，消食，行氣，止痛，去穢氣之效。治心腹冷痛，胸腹脹滿，胃寒疼痛，消化不良，急行胃腸炎，牙痛，雀斑，百日咳，風濕關節痛，跌打損傷。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(5)

馬蘭

編號：TARI-180

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Kalimeris indica* (Linn.) *Schul* tz-Bip
植物特徵：多年生草木。高30-50cm，具匍匐枝。初生葉叢生基部，莖生葉互生，幾無柄或翼柄，葉片披針形，倒披針狀橢圓形倒卵狀橢圓形，長 5-10cm，寬1.5-2.5 cm，基部漸狹而下延伸柄，先端尖或漸尖，全緣或中上部疏粗齒緣，兩面光滑或被疏毛。全年均有花果。

生長習性：臺灣全境平野至山區自生或零星栽培觀賞及藥用。
利用部位：全草。
主要成分：揮發油，桉油素，龍腦，桂皮酸乙酯，山奈酚，山奈素，黃酮類，香豆素，蛋白質，澱粉，黏液質等。
藥　　效：全草清熱，涼血，去瘀利濕，消積，殺菌，解毒之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

水蜈蚣

編號：TARI-181

中文科名：莎草科
英文科名：Cyperaceae
學　　名：*Kylinga cororata* (Linn.) Druce
植物特徵：多年生草本，根狀莖匍匐。分生成叢或疏散群生，葉片線狀帶形，先端尖，疏細鉅齒緣，穗狀花序球形或卵形，白色，小花序極多數，小堅果倒卵形而稍扁。
生長習性：臺灣全境及蘭嶼平野至山區水邊、田畔、濕潤空墟地草叢中。
利用部位：全草。
主要成分：全株具揮發油。
藥　　效：疏風、發表、清熱、止咳、利濕、消腫、散瘀。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

九芎

編號：TARI-182

中文科名：千屈菜科
英文科名：Lythraceae
學　　名：*Lagerstroemia subcostata* Koehne
植物特徵：落葉性灌木或喬木。幹皮茶褐色或白色。嫩枝、葉及花序皆被絨毛。葉互生或近對生，具短柄，略呈2列平排，矩圓形或矩圓狀披針形，全緣。圓錐花序，頂生，花密生，淡黃色。蒴果橢圓形，花期6－7月。
生長習性：台灣全境平野至低海拔山區廣見自生。
利用部位：花、根。
主要成分：水分、鞣質、木質素、纖維素、戊聚糖、土耳其鞣酸。
藥　　效：爲敗毒散瘀之藥。治腹痛、中毒、創傷、毒蛇咬傷。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑（1）

六稜菊

編號：TARI-183

中文科名：菊科
英文科名：Compositae.
學　　名：*Laggera alata* (Roxb.) Sch.-Bip.
植物特徵：多年生草本，高40-100cm。根狀莖粗短。莖直立，多分枝，4-6稜，稜上具有綠色翅狀附屬物，全株密生淡黃色柔毛及腺點，有特殊氣味。葉橢圓狀倒披針形或橢圓形，長5-10cm，寬1-2.5cm，邊緣具細齒，先端鈍或短尖，基部漸窄，下延至莖成翅，上部葉較窄小，條狀披針形。秋季開花，頭狀花序一至數個單歧聚傘狀排列，果時稍下垂，花全部管狀，紫色，先端5齒裂，雄蕊5個，花藥聚生；雌蕊1個。瘦果有柔毛，冠毛白色。
生長習性：生於田邊、路旁、山坡、林邊。
利用部位：全草。
主要成分：含揮發油、生物鹼、皀甘、黃酮甘、糖類。
藥　　效：祛風利濕，活血解毒。
資料來源：常見藥草(4)

馬纓丹

編號：TARI-184

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Lantana camara* L.
植物特徵：多年生灌木藤狀。全株具強烈氣味，稍被毛，莖圓形，新枝近方形，具逆鈎刺。葉對生，柄長 0.3-1cm，葉片皺縮粗糙感，卵形或矩圓狀卵形，長3-8cm，寬1.5-4cm，基部闊楔形或心臟形，先端尖或漸尖，鈍齒緣，背面脈上密被毛或具小刺。頭狀花序，腋出，對生或偶單生。
生長習性：全境平野廣泛於暖、熱帶地方。山麓、墓園、路旁歸化自生或庭園栽培。
利用部位：根、莖、葉、花。
主要成分：葉含lantadene A,B 尚含lantanolic acid，lantic acid及還原糖、鞣質、樹脂，生物鹼。
藥　　效：(1)根有活血，祛風，利濕，清熱之效。
(2)莖、葉有消腫解毒，祛風止癢之效。
(3)花有清涼解毒，活血止血。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

白茅

編號：TARI-185

中文科名：禾本科
英文科名：Gramineae
學　　名：*Imperata cylindrical* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb.ex Hubb & Vaughan
植物特徵：多年生草本，地下莖十分發達，長而多節，黃白色；稈叢生，高約30-80cm；葉狹長，線形，葉舌膜質，葉緣粗糙；花序爲緊縮的圓錐花序，整個呈穗狀，長約6-18cm，密生長絲狀毛；每朵小花有雄蕊1-2枚，花柱2枚；穎果長橢圓形。
生長習性：台灣低海拔山區、平地尤其是海濱。
利用部位：嫩芽、嫩莖、嫩花穗及地下莖。
主要成分：含甘露醇、果糖、葡萄糖、蔗糖、檸檬酸、蘋果酸、鉀鹽等。
藥　　效：有利尿、解濕之功。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

板藍根

編號：TARI-186

中文科名：十字花科
英文科名：Cruciferae
學　　名：*Isatis indigotica* Fort.
植物特徵：二年生草本，主根深長，外皮淺黃棕色。莖直立，上部多分枝。葉互生，基生葉較大，具柄，葉片長圓狀橢圓形，全緣或波狀，有時呈不規則齒裂，莖生葉長圓形至長圓狀倒披針形；闊總狀花序，花梗細長，長角果，花期5月，果期6月。
生長習性：分布於我國華北及陝西、山東等地。
利用部位：根、根莖。
主要成分：indoyl-β-glucoside、β-穀甾醇、靛紅、板藍根乙素($C_5H_7NO_3$)、板藍根丙素($C_{26}H_{48}O_{16}$)、板藍根丁素($C_{18}H_{30}O_{10}$)、植物蛋白、樹脂狀物、糖類。根中含精氨酸、穀氨酸、酪氨酸。
藥　　效：味苦，性寒。有清熱解毒、涼血的功能。用於溫熱發熱、發熱感冒、咽喉腫爛。
資料來源：中國本草彩色圖鑑(上)

兔兒菜

編號：TARI-187

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai
植物特徵：多年生草本，高10-40cm。全株無毛，折之則流出白乳汁。基生葉蓮座狀，條狀披針形或倒披針形，長7-11cm， 寬1-2cm，先端鈍或急尖，基部下建成窄葉柄，全緣或具疏小齒或不規則羽裂；莖生葉1-2枚，無葉柄，稍抱莖，頂端之葉抱莖。頭狀花序排成傘房狀聚傘花序；總苞長7-9mm，外層總苞片卵形，內層總苞片條狀披針形；舌狀花黃色或白色，長10-12mm，先端5齒裂。瘦果狹披針形，稍扁平，紅棕色，長 4-5mm，喙長約2mm，冠毛白色。全草具苦味。生山地及荒野，爲田間雜草。
生長習性：全台各地平野皆有。
利用部位：全草或根。
藥　　效：清熱解毒，消腫排膿，涼血止血。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (2)

茉莉

編號：TARI-188

中文科名：木犀科
英文科名：Oleaceae
學　　名：*Jasminum sambac* Ait.
植物特徵：常綠亞蔓狀灌木。幼枝無毛或被柔毛。葉對生，具短柄，葉片寬卵形、橢圓形或倒卵形，長3-8cm，寬2.5-5cm，基部楔形或心形，先端鈍形或突尖，全緣，兩面無毛或偶脈上有毛。聚繖花序， 頂生或腋生，3-多朵聚生。
生長習性：各地普遍作觀賞或香料作物栽培。
利用部位：根。
主要成分：根含生物鹼，固醇。花含精油。內含苯甲醇及酯類。
藥　　效：根有麻醉，止痛之效。葉有清熱，解表，利濕之效。茉莉花露有理氣，健脾，美容之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

龍柏

編號：TARI-189

中文科名：柏科
英文科名：Cupressaceae
學　　名：*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuca* Hort.
植物特徵：常綠灌木至喬木，樹姿呈細尖塔形，主幹常旋轉；葉幾乎全爲鱗片狀，少數爲針狀葉；毬果藍綠色，肉質，略被蠟粉，熟時不開裂。
生長習性：全境公園、庭園普遍栽培之園景樹。
利用部位：根或枝幹、細枝葉。
主要成分：含雪松醇、柳杉酚、陶塔酚及山達海松酸。
藥　　效：根及枝幹有祛風除濕、消腫止痛之效。
資料來源：原色台灣藥用植物(4)

爵床

編號：TARI-190

中文科名：爵床科
英文科名：Acanthaceae
學　　名：*Justicia procumbens* L.
植物特徵：一年生草本，莖直立或斜上，方形，具毛，多分枝。葉對生，具短柄，橢圓形，全緣。穗狀花序生於頂端，花朵密集，淡紅紫色。蒴果長橢圓形。種子扁平心形，褐色。
生長習性：台灣全島中、低海拔地區。
利用部位：全草。
主要成分：含生物鹼、爵床新素(C、D、E)、去甲氧基爵床新素D。
藥　　效：清熱解毒、利濕消滯、活血止痛，全草亦是百草茶原料。
資料來源：中草藥彩色圖譜

南五味

編號：TARI-191

中文科名：木蘭科
英文科名：Magnoliaceae
學　　名：*Kadsura japonica* (Linn.) Dunal
植物特徵：常綠藤本，植株無毛，葉片橢圓形或橢圓形狀披針形。花乳黃色或淡黃白色，漿果成熟時紫紅色，多數聚集於花托成頭狀。種子腎形，乳黃色。
生長習性：臺灣全境山麓至低海拔山區之濕潤灌叢中或疏林內。
利用部位：藤部。
主要成分：藤含kadsuric acid、kadsurin。果實含germacrene。
藥　　效：藤有解熱止渴、舒筋、活血、解毒之效。治頭痛、腹痛、胃炎、中暑、糖尿病、毒蛇咬傷。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈3〉

山奈

編號：TARI-192

中文科名：薑科
英文科名：Zingiberaceae
學　　名：*Kaempferia galanga* L.
植物特徵：多年生宿根草本。根狀莖塊狀，具芳香。葉2-4片簇生，幾無柄，具葉鞘，常貼近地面，葉片近圓形或廣卵形，基部鈍圓形，全緣或略微波緣，背面疏生長柔毛。乾燥葉面呈紅色小點。花6-12朵頂生莖上，半藏於葉鞘內，陸續單頂朵開放，花白色，瓣片基部常具紫色條斑紋，有香味，易凋謝。子房下位，具2枚棒狀附屬體，花柱細長，柱頭盤狀。蒴果。花果期6-10月。
生長習性：各地零星觀賞栽培。
利用部位：全株。
主要成分：揮發油，桉油素，龍腦，桂皮酸乙酯，山奈酚，山奈素，黃酮類，香豆素，蛋白質，澱粉，粘液質等。
藥　　效：有溫中，消食，行氣，止痛，去穢氣之效。治心腹冷痛，胸腹脹滿，胃寒疼痛，消化不良，急行胃腸炎，牙痛，雀斑，百日咳，風濕關節痛，跌打損傷。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(5)

馬蘭

編號：TARI-193

中文科名：菊科

英文科名：Compositae

學　　名：*Kalimeris indica* (Linn.) Schul tz-Bip

植物特徵：多年生草木。高30-50cm，具匍匐枝。初生葉叢生基部，莖生葉互生，幾無柄或翼柄，葉片披針形，倒披針狀橢圓形倒卵狀橢圓形，長 5-10cm， 寬 1.5-2.5 cm，基部漸狹而下延伸柄，先端尖或漸尖，全緣或中上部疏粗齒緣，兩面光滑或被疏毛。全年均有花果。

生長習性：臺灣全境平野至山區自生或零星栽培觀賞及藥用。

利用部位：全草。

主要成分：揮發油，桉油素，龍腦，桂皮酸乙酯，山奈酚，山奈素，黃酮類，香豆素，蛋白質，澱粉，黏液質等。

藥　　效：全草清熱，涼血，去瘀利濕，消積，殺菌，解毒之效。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

水蜈蚣

編號：TARI-194

中文科名：莎草科

英文科名：Cyperaceae

學　　名：*Kylinga cororata* (Linn.) Druce

植物特徵：多年生草本，根狀莖匍匐。分生成叢或疏散群生，葉片線狀帶形，先端尖，疏細鉅齒緣，穗狀花序球形或卵形，白色，小花序極多數，小堅果倒卵形而稍扁。

生長習性：臺灣全境及蘭嶼平野至山區水邊、田畔、濕潤空墟地草叢中。

利用部位：全草。

主要成分：全株具揮發油。

藥　　效：疏風、發表、清熱、止咳、利濕、消腫、散瘀。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

九芎

編號：TARI-195

中文科名：千屈菜科
英文科名：Lythraceae
學　　名：*Lagerstroemia subcostata* Koehne
植物特徵：落葉性灌木或喬木。幹皮茶褐色或白色。嫩枝、葉及花序皆被絨毛。葉互生或近對生，具短柄，略呈2列平排，矩圓形或矩圓狀披針形，全緣。圓錐花序，頂生，花密生，淡黃色。蒴果橢圓形，花期6－7月。
生長習性：台灣全境平野至低海拔山區廣見自生。
利用部位：花、根。
主要成分：水分、鞣質、木質素、纖維素、戊聚糖、土耳其鞣酸。
藥　　效：爲敗毒散瘀之藥。治腹痛、中毒、創傷、毒蛇咬傷。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑（1）

馬纓丹

編號：TARI-196

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Lantana camara* L.
植物特徵：多年生灌木藤狀。全株具強烈氣味，稍被毛，莖圓形，新枝近方形，具逆鈎刺。葉對生，柄長 0.3-1cm，葉片皺縮粗糙感，卵形或矩圓狀卵形，長3-8cm，寬1.5-4cm，基部闊楔形或心臟形，先端尖或漸尖，鈍齒緣，背面脈上密被毛或具小刺。頭狀花序，腋出，對生或偶單生。
生長習性：全境平野廣泛於暖、熱帶地方。山麓、墓園、路旁歸化自生或庭園栽培。
利用部位：根、莖、葉、花。
主要成分：葉含(lantadene A,B)尚含lantanolic acid，lantic acid及還原糖、鞣質、樹脂，生物鹼。
藥　　效：(1)根有活血，祛風，利濕，清熱之效。
(2)莖、葉有消腫解毒，祛風止癢之效。
(3)花有清涼解毒，活血止血。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

白花益母草

編號：TARI-197

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Leonurusn artemisia* (Lour.) S.Y.Hu
植物特徵：莖高30–120釐米，有倒生的白毛。莖下部的葉卵形，掌狀3全裂，中裂片有3小裂，兩側裂片有1或2小裂；花序上的葉線形或線狀披針形，全緣或有少數牙齒，最小裂片寬在3毫米以上。苞片針形，等於或短於花萼，有細毛；花萼鍾形，長7–10毫米，外有毛，齒5，前2齒靠合；花冠淡紅色或紫紅色，長12–13毫米，筒內有毛環，上唇外面有毛、全緣，下唇3裂，中裂片倒心形。小堅果平滑，長圓狀三棱形。花果期6–10月。
生長習性：各地常見，生於路邊荒地上；分佈全國各地。
利用部位：全草。
主要成分：全草含有4一胍基丁醇，精氨酸，香樹精及益母草鹼。
藥　　效：活血，祛瘀，調經。治月經不調，產後血暈，換血腹痛，癰腫瘡瘍；子名茺蔚，可利尿，治眼疾。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

銀合歡

編號：TARI-198

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosea
學　　名：*Leucaena glauca* (L.) Berth
植物特徵：常綠或落葉小喬木。葉爲二回偶數狀複葉，互生，小葉片鐮狀長方形或長橢圓形。花淡紅色或緋紅色，頭狀花白色，小花約200餘朵。莢果扁平帶狀。
生長習性：臺灣山地海拔600–1800公尺間之山谷、山坡沙礫地多見。
利用部位：幹皮。
主要成分：樹皮含皂甘、鞣質。葉含蛋白質、鞣質、粗脂肪。種子含合歡氨酸。
藥　　效：解鬱、和血、寧心、健脾胃、消腫、止痛、殺蟲。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈3〉

亞麻

編號：TARI-199

中文科名：亞麻科
英文科名：Linaceae
學　　名：*Linum usitatissimum* Linn.
植物特徵：一年生草本。莖纖細，直立，基部木質化。葉互生，無柄，葉片線形或線狀披針形，全緣。聚繖花序，花生於枝端葉腋。蒴果球形稍扁，卵形或橢圓狀卵形，黃褐色。花期2-3月，果期4-5月。
生長習性：中南部作纖維、採油經濟作物栽培。
利用部位：盛花期取全草，曬乾，取根部莖葉分開整理處儲藏。
主要成分：全草含菜豆甘、亞麻苦甘、酵素分解產生氰酸、葡萄糖、丙酮。莖葉含菘草素、異菘草素、牡荊素、異牡荊素。種子含脂肪油、蛋白質、黏液質、糖類、有機酸、維生素A、B。
藥　　效：根有平肝、活血、補虛、烏鬚髮之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

麥門冬

編號：TARI-200

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Liriope platyphylla* Wang et. Tang
植物特徵：多年生草本。植株叢生；根多分枝，常局部膨大成紡錘形或圓矩形小塊根，塊根長可達3.5cm，直徑約7-8mm。葉叢生，革質，長20-65cm，寬1-3.5cm，具9-11條脈。花葶通常長於葉，長35-100cm；總狀花序長25-40cm，具多數花，3-8朵簇生於苞片腋內；苞片小，剛毛狀；花被片矩圓形或矩圓狀披針形，長約3.5mm，紫色；花絲長約1.5mm；花藥長1.5-2mm；子房近球形，花柱長約2mm，柱頭三裂。種子球形，初期綠色，成熟後變黑紫色。花期7-8月，果期9-10月。

生長習性：生於山坡林下或溪旁。
利用部位：根、葉。
主要成分：含麥冬皂甘、麥冬酮、甲基麥冬黃酮、二氫麥冬黃酮等。
藥　　效：養陰生津、潤肺清火。用於肺燥乾咳、津傷口渴、心煩失眠、內熱消渴。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (5)

麥門冬(長)

編號：TARI-201

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Liriope spicata* Lour.
植物特徵：多年生草本。植株叢生；根多分枝，常局部膨大成紡錘形或圓矩形小塊根，塊根長可達3.5cm，直徑約7-8mm。葉叢生，革質，長20-65cm，寬1-3.5cm，具9-11條脈。花莛通常長於葉，長35-100cm；總狀花序長25-40cm，具多數花，3-8朵簇生於苞片腋內；苞片小，剛毛狀；花被片矩圓形或矩圓狀披針形，長約3.5mm，紫色；花絲長約1.5mm；花藥長1.5-2mm；子房近球形，花柱長約2mm，柱頭三裂。種子球形，初期綠色，成熟後變黑紫色。花期7-8月，果期9-10月。
生長習性：生於山坡林下或溪旁。
利用部位：根、葉。
主要成分：含麥冬皂甘、麥冬酮、甲基麥冬黃酮、二氫麥冬黃酮等。
藥　　效：養陰生津、潤肺清火。用於肺燥乾咳、津傷口渴、心煩失眠、內熱消渴。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (5)

蒲葵

編號：TARI-202

中文科名：棕櫚科
英文科名：Palmae
學　　名：*Livistona subglobosa* Mart.
植物特徵：常綠喬木，單幹直立，有不整齊粗糙的環紋及縱紋，其葉大呈掌狀圓扇形，為其一大特色。圓錐花序，疏散而廣岐，生於葉腋內。佛焰花苞棕色，筒狀，革質，2裂。花小，淡綠色，幾無柄。核果橢圓形或矩圓形，狀似橄欖。春、夏花期。
生長習性：平原各地觀賞栽培。
利用部位：根、葉柄、葉片、種子。
主要成分：種子含酚類，還原糖，鞣質，甘油三酯。
藥　　效：葉柄及葉有止血之效。種子抗癌。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

岡梅

編號：TARI-203

中文科名：冬青科
英文科名：Aquifoliaceae
學　　名：*Llex asprella* (Hook.et Arn.) Champ.
植物特徵：落葉灌木。高1-3m。嫩枝被短毛。葉互生，葉片卵圓形或橢圓形，細鋸齒緣。花腋生，雌雄異株，數朵簇生，花梗纖細，花白色，核果橢圓形，3-5月開花，7月果熟。
生長習性：臺灣全境平野至低海拔山區自生。
利用部位：根、粗幹。
主要成分：oleanolic acid、hederagenin、ursolic acid、麥胚固醇、caffeine、theophylline
藥　　效：有清熱、生津、活血、固肺之效。治感冒、頭暈、肺炎。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

南薑

編號：TARI-204

中文科名：薑科
英文科名：Zingiberaceae
學　　名：*Lnaguas galanga* (L.) Stuntz
植物特徵：多年生草本，根莖粗壯，淡紅棕色。葉片狹長橢圓形，小苞片狹長圓形，萼筒狀，白色，具淺粉紅色縱走條紋。蒴果肉質，矩圓形或卵圓形。
生長習性：臺灣全境平野溪旁，灌叢中自生或人家零星栽培。
利用部位：根莖。
主要成分：揮發油、桂皮酸甲酯、丁香油酚、樟腦、黃酮類高良薑素。
藥　　效：清熱、利尿、排毒、消腫之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

半邊蓮

編號：TARI-205

中文科名：桔梗科
英文科名：Campanulaceae
學　　名：*Lobelia chinensis* Lour.
植物特徵：多年生矮小草本，高5-15公分，全株光滑無毛，有乳汁。根細圓柱形，淡白色。莖細弱匍匐，節處著地生多數鬚根，上部直立。葉互生，無柄，條形或條狀披針形，長1.2-2.5cm，寬2.5-6mm，全緣或有疏齒。夏季葉腋開單生淡紫色或白色小花；花冠基部合成管狀，上部向一邊5裂展開，中央3裂片較淺，兩側裂片深裂至基部；雄蕊5個，花絲基部分離，花藥彼此連合，圍抱柱頭，花藥位於下方的兩個有毛，上方的3個無毛。子房下位。蒴果頂端2瓣開裂。種子細小，多數。

生長習性：多生於田埂草地、溝邊、溪邊濕地。
利用部位：全草。
主要成分：含有多種生物鹼、皂甘、黃酮類、氨基酸。
藥　　效：清熱解毒，利尿消腫。
資料來源：全國中草藥匯編．上冊

金銀花

編號：TARI-206

中文科名：忍冬科
英文科名：Caprifoliaceae
學　　名：*Lonicera japonic*a Thunb.
植物特徵：常綠藤本。全株被短毛。葉對生，柄長0.8-1.0cm，具絨。葉薄紙狀，卵形至狀長橢圓形，長4.5-6cm，寬2.5-3.5cm，基部截形、圓形或類心臟形，全緣，表面被柔毛，背面密生絨毛，葉緣具緣毛。花期全年。

生長習性：生於山坡疏林中。
利用部位：花。
主要成分：花含黃酮類化合物木犀草素及綠原酸、異綠原酸，並含揮發油約0.6%，油中含30種以上成分，主要有雙花醇和芳樟醇。尚含馬錢素、少量肌醇、醇類、皂甘及鞣質。
藥　　效：有清熱解毒、涼散風熱的功效。用於癰腫疔瘡、喉痺、丹毒、風熱感冒。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(下)

枸杞

編號：TARI-207

中文科名：茄科
英文科名：Solanaceae
學　　名：*Lycium chinense* Miller
植物特徵：落葉灌木，高1-3m莖直立，灰黃色，上部分枝柔軟，常下垂，短枝刺狀，花冠漏斗狀，花梗細，初時粉紅色或淡紫粉紅色，後現灰黃白色，漿果倒卵形，橘紅色或紅色。
生長習性：野生或栽培，生於河岸、乾山坡、沙礫地。
利用部位：果實。
主要成分：果實含甜菜鹼、酢漿紅素、胡蘿蔔素。
藥　　效：有滋補肝腎、益精明目的功能。用於頭昏、目眩、耳明、視力減退、虛勞咳嗽、腰脊酸痛、遺精、糖尿病。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑（下）

夜合花

編號：TARI-208

中文科名：木蘭科
英文科名：Magnoliaceae
學　　名：*Magnolia coco* (Lour.) DC
植物特徵：常綠灌木。高2-3m。葉互生，柄長5-10cm，葉片革質，光滑無毛，橢圓形至長圓形，長7-18Cm，寬3-6.5cm，基部長楔形，先端尾狀漸尖，波狀全緣而反卷，網狀脈兩面突起。花期5-7月。
生長習性：原產中國華南、越南。
利用部位：花朵。
主要成分：莖含oxoushinsunine、salicifoline、magnoflorine、stephanine、anolobine、magnococline。
藥　　效：花有駁骨，安五臟之效。治肝鬱氣痛，癥瘕，婦女白帶。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

歐夏至草

編號：TARI-209

中文科名：唇形花科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Marrubium vulgare* L.
植物特徵：多年生耐寒的植物，高約3尺；莖叢生，呈方形；葉表多皺紋，橢圓形，有香味，葉緣有鋸齒；淡淡的白色小花開在6-9月間。
生長習性：生長乾燥灌木叢生地帶。
利用部位：地上部分或全草。
主要成分：含揮發油。
藥　　效：治療肝膽疾病、天花、頰咽炎、咳痰。外洗治療癢疹。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈4〉

蘋(田字草)

編號：TARI-210

中文科名：蘋科
英文科名：Marsileaceae
學　　名：*Marsilea quadrifolia* L.
植物特徵：植株高5-20cm。根莖細長，橫生，分叉，頂部有淡褐色毛，莖節遠離，向上生長1至數葉。葉柄長5-20cm；小葉4片，草質，無毛，倒三角形，浮於水面；葉脈扇形，網狀，網眼狹長。葉柄基部生有1或分叉短柄，先端生有孢子果，果長圓腎形，幼時被密毛，後變無毛；孢子囊多數，大、小同生於一個孢子果內壁的囊托上，大孢子囊有一個大孢子，小孢子囊內有多數小孢子。
生長習性：生於池邊、溝邊及水田的靜水淺水中，當有水時，葉柄沒於水中，葉片漂浮水面。
利用部位：全草。
主要成分：全草含環阿片甾醇(cyclolaudenol,$C_{31}H_{52}O$)、長鏈脂肪族化合物及含量較高的蛋白質成分，還含[22(29)-何帕烯[22(29)-hopene]，17(21)-何帕烯17(21)-hopene)，9(11)-羊齒烯[9(11)-fernene]，香豆精(coumarin)，對香豆酸(p-coumaric acid)，香草酸(vanillic acid)，3,5-二羥基苯甲酸(3,5-resor-cylic acid)，對羥基苯甲酸(p-hydroxy-benzoic acid)。
藥　　效：泌尿系感染，腎炎水腫，肝炎，小便不利，黃疸，吐血，衄血，尿血，崩漏白帶，月經量多，心煩不眠，消渴，感冒，小兒夏季熱，癰腫瘡毒，瘰歷，神經衰弱，乳腺炎，咽喉腫痛，急性結膜炎；外用治乳腺炎，瘧疾，疔瘡癧腫，蛇咬傷。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈2〉

野牡丹

編號：TARI-211

中文科名：野牡丹科
英文科名：Melastomataceae
學　　名：*Melastoma candidum* D. Don
植物特徵：灌木，高0.5-1.5m。莖鈍四稜形或近圓柱形，莖、葉柄密被緊貼的鱗片狀糙伏毛。葉對生；葉柄長5-15mm；葉片堅紙質，卵形或廣卵形，長 4～10 cm，寬 2-6cm，先端尖，基部淺心形或近圓形，全緣，兩面被糙伏毛及短柔毛；基出脈7條。繖房花序生於分枝頂端，近頭狀，有花3-5朵，稀單生，基部具葉狀總苞2；苞片、花梗及花萼密被鱗片狀糙伏毛；花梗長3-20mm；5數，花萼長約2.2cm，裂片卵形或略寬，與萼管等長或略長，先端漸尖，兩面均被毛；花瓣玫瑰紅色或粉紅色，倒卵形，長3-4cm，先端圓形，密被緣毛；雄蕊5長5短，長者藥隔基部伸長，彎曲，末端2深裂，短者藥室基部具一對小瘤；子房半下位，5室，密被糙伏毛，先端具一圈剛毛。蒴果壇狀球形，與宿存萼貼生，長1-1.5cm，直徑8=12mm，密被鱗片狀糙伏毛；種子鑲於肉質胎座內。花期5-7月，果期10-12月。

生長習性：生於低海拔以下的山坡松林下或開闊的灌草叢中。
利用部位：全株、果實、根。
主要成分：全株含有鞣質、酮甘、酚類、醣類、脂肪等。
藥　　效：主治食積、洩痢、肝炎、跌打腫痛、外傷出血、衄血、咳血、吐血、便血、月經過多、崩漏、產後腹痛白帶、乳汁不下、血栓性脈管炎、腸癰、瘡腫、毒蛇咬傷。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

苦楝

編號：TARI-212

中文科名：楝科
英文科名：Meliaceae
學　　名：*Melia azedarach* L.
植物特徵：落葉喬木，高約10公尺。葉爲2回奇數羽狀複葉，各小葉卵形或披針形，全緣或有鋸齒。三、四月間開花，淡紅色，小形，排成圓錐花序，萼鐘形5裂，5花瓣。雄蕊10個，花絲相連而成筒狀，淡紫色。花柱一個，核果卵狀球形，徑約1公分，熟時黃色。種子長橢圓形暗褐色。

生長習性：生長於山坡地、田野、路邊。
利用部位：根皮或樹皮。
主要成分：川楝素、印楝波靈A、苦內酯、苦洛內酯。
藥　　效：驅蛔、抑菌作用　。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈上〉

香蜂草

編號：TARI-213

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Melissa officinalis* L
植物特徵：多年生草本植物，全株密被細絨毛，根細短，地下莖分佈廣，地上部的莖呈方形，分枝性強，極易叢生，植株性狀強健；葉對生，葉脈明顯，葉形爲寬卵形或心臟形，葉緣爲圓鋸齒或鋸齒，葉片搗碎時或烘乾後會散發檸檬香味，香味濃烈；花色爲白色或淡黃色，歐美地區開花期於7月至10月；種子極小。
生長習性：性喜潮濕，高溫或多雨的環境可生長良好，在台灣適應良好。
利用部位：全草。
主要成分：含有檸檬醛、沉香醇、香葉醇、香茅醛等。
藥　　效：具驅風、發汗等作用。
資料來源：藥用植物圖鑑

薄荷

編號：TARI-214

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Mentha arvensis* L.
植物特徵：多年生草本高10-80厘米。莖方形，被逆生的長柔毛及腺點。單葉對生；葉柄長2-15毫米，密被白色短柔毛；葉片長卵形至橢圓狀披針形，長3-7厘米，先端銳尖，基部闊楔形，邊緣具細尖鋸齒，密生緣毛，上面被白色短柔毛，下面被柔毛及腺點。花期8-10月。果期11月。
生長習性：生於水邊濕地。
利用部位：全草。
主要成分：含薄荷油、薄荷腦、薄荷酮。
藥　　效：驅蛔、抑菌作用。
資料來源：常見中草藥(2)

皺葉薄荷

編號：TARI-215

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Mentha piperita* Linn.
植物特徵：蔓生植物，莖四稜，直立而分枝，葉芳香，花著生於葉腋。
生長習性：潮濕，有陽光的沃土。
利用部位：花、葉。
主要成分：含薄荷油。
藥　　效：食物調味、幫助消化、減少胃脹氣、抗菌、抗病毒、殺寄生蟲及發汗。
資料來源：藥用植物圖鑑

仙草

編號：TARI-216

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Mesona procumbens* Hemsley
植物特徵：一年生或越年生草本。莖直立或長後斜生，莖方型，褐色欽或帶紫紅色。葉對生，葉片卵形或卵狀長橢圓形。輪繖花序而呈總狀花序排列，頂生或腋生，花淡紫色，瘦果細小，倒卵形，具斜紋。
生長習性：臺灣全境平野至山麓自生。
利用部位：地上部。
主要成分：全草含碳水化合物。內含半乳糖、阿拉伯糖、木糖等。
藥　　效：全草清熱、解渴、涼血、降血壓之效。治中暑、感冒、肌肉痛、關節痛、高血壓、糖尿病等。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

含笑花

編號：TARI-217

中文科名：木蘭科
英文科名：Magnoliaceae
學　　名：*Michelia fuscata* Bl.
植物特徵：常綠灌木。樹皮灰褐色。多分枝密生。芽、幼枝、葉柄及花梗均被黃褐色絨毛。葉互生，葉片革質，狹橢圓形或倒卵狀橢圓形，基部楔形，先端漸尖形或尾狀漸尖形，全緣，上面光澤，背面脈上被黃褐色毛。
生長習性：原產福建、廣東。華南各省普遍栽培。
利用部位：利用根、葉、花。
主要成分：葉含magnolamine，magnoline，magnocurarine及tetrandrine。花含揮發性芳香精油。
藥　　效：根有去濕，消炎之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(4)

破布子

編號：TARI-218

中文科名：椴樹科
英文科名：Boraginaceae
學　　名：*Microcos paniculata* L
植物特徵：落葉性喬木。樹皮厚，纖維質，嫩枝有毛。葉互生，柄內側具溝，長3-5cm，葉片卵形至矩圓狀卵形，長6-12cm，寬3-5cm，基部渾圓，先端鈍尖，全緣或微波緣，葉面往往生有茹狀物，中肋背面被毛。花序頂生或腋生，叉狀聚繖花序，有毛，萼鐘狀，呈不規則的2裂或3裂，外面被毛。
生長習性：全境平野、路旁、村落人家附近栽培或自生狀態。
利用部位：根。
主要成分：木材含α-, β-, γ-eudemol。
藥　　效：根有行氣止痛，化痰止咳，收斂止汗之效。果實有鎮咳，緩下之效，治急慢性支氣管炎。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

崑明雞血藤

編號：TARI-219

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Millettia reticulata* Benth.
植物特徵：常綠攀緣灌木，莖攀緣，奇數羽狀複葉互生，小葉7-9，長橢圓形或卵狀橢圓形，花紫色 或深紅色，頂生圓錐花序，下垂，花期5-8月；果期10-11月。播種、扦插或分株法繁殖。雞血藤枝葉繁茂，四季常青，夏日紫花串串，可令其攀緣棚架；也可就大樹旁栽植，攀緣而上；於斜坡、岸邊種植，枝蔓自如生長，宛如綠色地毯。
生長習性：喜光；喜溫暖濕潤氣候，不耐寒；耐乾旱瘠，適應性強。
利用部位：藤莖。
主要成分：含兒茶酚鞣質。還原糖，中性樹脂，揮發油及類固醇物質。
藥　　效：補血活血，舒筋活絡。
資料來源：中草藥彩色圖譜

含羞草

編號：TARI-220

中文科名：含羞草科
英文科名：Mimosaceae
學　　名：*Mimosa pudica* L.
植物特徵：葉互生，具二回羽狀複葉。總柄很長，基部膨大成葉枕，即在含羞草的小羽片、羽軸和葉柄的基部，都有一肥大部分，叫葉枕。全株生有毛茸及銳刺，高約爲二十至六十公分。含羞草的葉子具有相當長的葉柄，柄的前端分出四根羽軸，每一根羽軸上著生兩排長橢圓形的小羽片，它大約在盛夏以後開花，粉紅色的頭狀花序散布在草原上，像一團團疏落的小絨球。
生長習性：全省路旁、空地、草生地等開闊場所，河邊及海邊常可見到大群落。
利用部位：全草。
主要成分：含羞草鹼甘、黃甘類、酚類、氨基酸、含羞草鹼。
藥　　效：可治風濕痛、神經衰弱、失眠，可敷治腫痛及帶狀皰疹等，頗具止痛消腫之效。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈上〉

山苦瓜

編號：TARI-221

中文科名：葫蘆科
英文科名：Cucurbitaceae
學　　名：*Momordica charantia* L.
植物特徵：一年生攀緣草本。莖被柔毛，捲鬚不分叉。葉互生，具柄，小裂片具齒或再分裂，兩面微被毛，脈上毛較密。五至七月開花，一植株內可見雌雄兩種花。花單生，具長梗，花梗中部或下部生1苞片，花冠黃色，5裂，雌花子房紡錘形，密生瘤狀突起。果實紡錘狀，有瘤狀突起。
生長習性：全國各地均有栽培。
利用部位：果實、根、葉、花。
主要成分：果實含腺鹼。鮮果肉含蛋白質、脂肪、糖、鈣、磷、鐵等。
藥　　效：清熱解毒。
資料來源：常見中草藥第四輯

木鱉子

編號：TARI-222

中文科名：葫蘆科
英文科名：Cucurbitaceae
學　　名：*Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng .
植物特徵：多年生草質藤本。莖有稜，無毛，捲鬚單一，與葉對生。葉互生，圓心形，直徑7-14cm，3-5中裂或深裂，偶有7裂，裂片卵形或長卵形；葉柄頂端或葉片基部有2-5腺體。花單性同株；雄花梗細長，每花具1大苞片，花萼黑褐色，有黃白色斑點，花冠淺黃白色；雌花梗短，苞片較小。瓠果長橢圓形，長9-15cm，熟時紅色，表面有軟質刺突。種子暗黑色。花期6-8月，果期8-11月。
生長習性：生於山坡林下或灌叢中。
利用部位：種子。
主要成分：含木鱉子酸（momordic acid）、絲石竹皂甘元（gypsogenin）、齊墩果酸（oleanolic acid）、α-桐酸（α-elaeostearic acid）、氨基酸、甾醇。
藥　　效：散結消腫，攻毒療瘡。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

檄樹

編號：TARI-223

中文科名：茜草科
英文科名：Rubiaceae
學　　名：*Morinda citrifolia* L
植物特徵：常綠小喬木，葉長橢圓形，對生，夏天開花，花白色，頭狀花序，果實爲複合果。
生長習性：台灣原產野生於山谷、溪邊或山林下。
利用部位：根部及葉。
藥　　效：抗菌作用、根治赤痢也作解熱劑及強壯劑、葉治刀傷及潰瘍。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

辣木

編號：TARI-224

中文科名：辣木科
英文科名：Moringaceae
學　　名：*Moringa oleifera*
植物特徵：落葉小喬木，株高可達8公尺；地下有塊根；2-3回羽狀複葉，小葉橢圓形，先端鈍；小花白色，具芳香；莢果長筒形有縱溝，長可達40公分；夏季開花。
生長習性：以壤土或砂質壤土爲佳。排水、日照需良好。冬季落葉後修剪整枝。性喜高溫多濕，生育適溫約23-32℃。
利用部位：根、葉、種子、樹皮及樹枝。
主要成分：含維他命 A、B、C、蛋白質、鈣、鉀、鐵等礦物質。
藥　　效：消化器癌和各種腫瘤淋巴腺的病變，風濕症、痛風、尿酸過多、高血壓、糖尿病、低血糖症、抗過敏、療皮膚病，據研究試治愛滋病也具有療效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

雞桑

編號：TARI-225

中文科名：桑科
英文科名：Moraceae
學　　名：*Morus australis* Poir.
植物特徵：爲多年生，落葉性大灌木（小葉桑）或小喬木（歸化桑），葉互生，葉緣有銳鋸齒或中裂，初春新葉與花同時綻放，但花爲雌雄異株，花爲葇荑花序，多花聚合果成熟時先轉紅再紫黑是爲桑椹或桑椹。
生長習性：生於石灰岩的山坡林地。
利用部位：以果實。
主要成分：胡蘿蔔甘、樹脂鞣酚、香樹脂醇、谷甾醇、硬脂酸和軟脂酸。
藥　　效：枝葉解熱、消炎、利尿、治喘咳、吐血、衄血、果實爲滋養強壯藥、治便祕、神經衰弱、煩躁失眠、貧血。
資料來源：中華本草(2)

白薺寧

編號：TARI-226

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Mosla grosseserrata* Maxim.
植物特徵：一、二年生草本，高15-90cm，全株被短柔毛。直立或傾斜，多分枝，四稜形。基生葉成蓮座狀，有柄，葉片長橢圓形，邊緣有鈍鋸齒，上面有顯著皺縮。莖生葉對生，卵形或長圓狀披針形，長2-6cm，先端鈍或急尖，基部圓楔形，邊緣有圓鋸齒，下面有金黃色腺點。夏初開小花，輪繖花序頂生及肢生，每輪2-6花，集成多輪的穗狀花序；花萼小，鐘狀，長約3mm，被疏毛及淡黃色腺點；花冠唇形，淡紫色，長不及4mm，上唇全緣，下唇3裂，中裂片倒心形，側裂片近於半圓形；雄蕊著生於下唇基部，伸出花冠管外而蓋於上唇之下，花藥1室；花盤在前邊延長。小堅果倒卵圓形，褐色。
生長習性：生於河邊、路旁、田邊、堤邊等陰濕處。
利用部位：全草。
主要成分：含胡蘿蔔素、腺嘌呤(adenine)、膽鹼(choline)、芸香甘、異槲皮甘(isoquercitrin)、葫蘆巴鹼(trigonelline)、麥角甾醇、多種維生素、糖、鞣質等。
藥　　效：有補肝益腎、涼血祛風，鎮咳寧肺、明目利尿，是一種強壯的藥劑。
資料來源：實用中草藥彩色圖集(一)

白肝炎草

編號：TARI-227

中文科名：鴨跖草科
英文科名：Commelinaceae
學　　名：*Murdannia bracteata* (C. B. Clarke) O. Kuntze ex J. K. Morton

植物特徵：匍匐草本。鬚根多而細。莖有毛。基生葉叢生，線形或闊線形，長10-24cm，寬1-1.5cm；莖生葉互生，葉片線形或長圓狀披針形，長3-8cm，寬8～12mm，先端急尖，基部呈鞘狀，葉鞘被毛，兩面無毛或下面被短柔毛。花密集成頭狀花序，生於枝端，直徑約1cm；花梗長2.5-5cm，總苞片披針形，長1-2.5cm，寬6-8mm；花梗粗短；小苞片大而宿存，膜質，圓形，長約5mm，成覆瓦狀排列；萼片3，長圓形，長約4mm；花瓣3，藍色或紫色；發育雄蕊3，退化雄蕊3，花絲被毛；子房橢圓形，花柱與子房幾等長。蒴果卵形，具3稜，每室有種子2顆。種子具皺紋。花期5月，果期8-11月。
生長習性：栽培於田園濕地。
利用部位：全草。
主要成分：蜕皮素、水龍骨素。
藥　　效：化痰散結，清熱通淋。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

紅肝炎草

編號：TARI-228

中文科名：鴨跖草科
英文科名：Commelinaceae
學　　名：*Murdannia bracteata* (C. B. Clarke) O. Kuntze ex J. K. Morton

植物特徵：匍匐草本。鬚根多而細。莖有毛。基生葉叢生，線形或闊線形，長10-24cm，寬1-1.5cm；莖生葉互生，葉片線形或長圓狀披針形，長3-8cm，寬8-12mm，先端急尖，基部呈鞘狀，葉鞘被毛，兩面無毛或下面被短柔毛。花密集成頭狀花序，生於枝端，直徑約1cm；花梗長2.5-5cm，總苞片披針形，長1-2.5cm，寬6-8mm；花梗粗短；小苞片大而宿存，膜質，圓形，長約5mm，成覆瓦狀排列；萼片3，長圓形，長約4mm；花瓣3，藍色或紫色；發育雄蕊3，退化雄蕊3，花絲被毛；子房橢圓形，花柱與子房幾等長。蒴果卵形，具3稜，每室有種子2顆。種子具皺紋。花期5月，果期8-11月。
生長習性：栽培於田園濕地。
利用部位：全草。
主要成分：蜕皮素、水龍骨素。
藥　　效：化痰散結，清熱通淋。
資料來源：全國中草藥匯編

石柃

編號：TARI-229

中文科名：芸香科
英文科名：Rutaceae
學　　名：*Murraya paniculata* Jack. var. *paniculata*
植物特徵：常綠灌木。羽狀複葉互生，小葉互生，卵形，2.5-5公分長，1.5-2.5公分寬，全緣；葉子對光看有細小油點，揉之有香氣；聚繖花序頂生或近枝條末端腋生；花萼5片；花瓣5片，白色，有香味；雄蕊10枚，有長短二型，間插排列；漿果橢圓形，成熟時紅色，徑約1公分，種子數目1-2。
生長習性：台灣分布於低海拔地區。
利用部位：枝葉與根部。
主要成分：莖皮含九里香素，葉含揮發油，花含東艮菪素。
藥　　效：根治風濕痺痛、腰痛、鐵打損傷、濕疹。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

腎蕨

編號：TARI-230

中文科名：腎蕨科
英文科名：Nephrolepis
學　　名：*Nephnolepis* cordifoolia Presl.
植物特徵：為多年生草本，根莖短小，根下有塊莖呈球形，肉質。莖叢生，直立，柄長6-12公分，密生赤褐色毛狀鱗片。葉片長25-65公分，羽 狀複葉，光滑無毛，羽片多數，無柄，呈覆瓦狀排列，微具鈍鋸齒。
生長習性：臺灣全境低海拔蔭涼之林叢、路邊斜地。
利用部位：塊莖。
主要成分：莖皮含九里香素，葉含揮發油，花含東艮菪素。
藥　　效：根治風濕痺痛、腰痛、鐵打損傷、濕疹。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈1〉

羅勒

編號：TARI-231

中文科名：唇形花科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Ocimum basilicum* L.
植物特徵：一年生直立草本，全體芳香，高20-70mm。莖四方形，上部多分枝，表面通常紫綠色，被柔毛。葉對生，卵形或卵狀披針形，長2-6mm，寬1-3.5mm，先端急尖或漸尖，基部楔形，邊緣有疏鋸齒或全緣，下面有腺點，葉柄長0.7-2mm。花期7-9月，果期8-10月。
生長習性：喜溫暖潮濕的氣候，排水良好、肥沃的砂質壤土或腐植質壤土爲佳。
利用部位：全草。
主要成分：含揮發油、羅勒烯、α-蒎烯、芳樟醇、檸檬烯、甲基胡椒酚、丁香油酚、茴香醚、桂皮酸甲酯等。
藥　　效：疏風行氣、化濕消食、活血解毒。治外感頭痛、食脹氣滯、月經不調、跌打損傷、蛇蟲咬傷、皮膚濕瘡。
資料來源：中藥大辭典(上)

沿階草

編號：TARI-232

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Ophiopogon japonica* (Linn. F.) Ker-Gawler
植物特徵：多年生草本植物。根呈塊根紡錘狀或長圓形塊，無莖。單葉叢生，狹線形，葉基銳，葉尖鈍，葉緣粗糙，下表面多少帶白粉狀，葉片放射狀，柔軟彎曲下垂。總狀花序，花莖直立，花梗略彎曲下垂，爲淡紫色至白色。果實爲蒴果、球形，種子成熟後爲深藍色。
生長習性：生於山坡林下或溪旁。
利用部位：塊根。
主要成分：含麥冬皂甘A、B、B'、C、C'、D、D'(ophiopogoninA，B，B'，C，C'、D，D')、麥冬酮A、B(ophiopogononeA，B)、甲基麥冬黃酮A、B(methy-1ophiopogononeA，B)、二氫麥冬黃酮A、B(ophiopogonanoneA，B)等。
藥　　效：有敗毒抗癌、養陰潤燥、清熱除煩之效。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(5)

仙人掌

編號：TARI-233

中文科名：仙人掌科
英文科名：Cactaceae
學　　名：*Opuntia ficus-indica* Mill.
植物特徵：常綠灌木，高達2.5m。莖基部近圓柱形，稍木質，上部有分枝，節明顯，葉狀枝扁平，倒卵形、棉圓形或長橢圓形，長15-30cm，肉質，深綠色，外被藍粉，其上散生多數小瘤體，每一小瘤體上簇生長1.2-2.5cm的利刺和多數倒生短刺毛。葉退化成鑽狀或針狀，青紫色，生於刺囊之下，早落。夏季開花，單生於近分枝頂端的小瘤體上，花鮮黃色，直徑約7cm；花被片多數，外部的綠色，向內漸變爲花瓣狀，腎狀扁圓形，先端凹入呈淺心形；雄蕊多數，排爲數輪，較花瓣爲短；花柱粗壯，直立，柱頭6裂。漿果肉質，有黏液，卵形或梨形，長5-7cm，紫紅色，有刺。
生長習性：生於村邊、石上、海濱沙灘等處，常有栽培。
利用部位：全株。
主要成分：莖含槲皮素-3-葡萄糖甘、樹脂、酒石酸、蛋白質。花含異鼠李素(isorhamnetin)和槲皮素(quercetin)的甘、蘋果酸、琥珀酸等。果實含蛋白質，還含有D-半乳糖(Dgalactose)和D-阿拉伯糖(D-arabinose)以分子比爲3：1組成的聚糖。種子含脂肪油。
藥　　效：胃、十二指腸潰瘍，痞塊，急性痢疾，咳嗽；外用治流行性腮腺炎，喉痛，肺熱咳嗽，肺癆咯血，吐血，痔血，瘡瘍疔癤，乳癰乳腺炎，癬疾，癰癤腫毒，蛇咬傷，燒燙傷。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

牛至(奧勒岡)

編號：TARI-234

中文科名：唇形花科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Origanum vulgare*
植物特徵：牛至一般又稱奧勒岡或馬郁蘭，有管狀至漏斗狀的小花，具2唇瓣，通常有明顯的苞片，輪生於叢狀的花穗上，花期從夏天一直到秋天。
生長習性：原生於乾燥且日照充足的空曠地區。
利用部位：葉。
主要成分：羥基化合物。
藥　　效：葉具有濃郁的辛辣味，在義大利披薩及番茄菜，墨西哥辣椒粉及點綴花束中應用。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

小本薄荷

編號：TARI-235

中文科名：唇形科

英文科名：Labiatae

學　　名：*Origanum vulgare* Linn. var. *formosanum Hayata*

植物特徵：多年生草本。植株具芳香。莖四稜形，稍被毛茸，葉對生，葉片廣卵形或矩圓狀卵形，基部鈍形或近圓形。穗狀繖房花序或成圓錐花序，頂生或腋生。苞片近卵形或倒披針形，花萼鐘形，裂片三角形。花冠筒狀鐘形。小堅果卵形，光滑。花期7-10月，果期10-11月。

生長習性：海拔2600-3800m之向陽坡地，路旁散生或群生。

利用部位：地上部。

主要成分：含揮發油、百里香酚、香荊芥酚。

藥　　效：莖葉有解表，理氣，化濕，利尿，祛痰，活血、化淤、止痛之效。

資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

桂花

編號：TARI-236

中文科名：木犀科

英文科名：Oleaceae

學　　名：*Osmanthus fragrans* Lour.

植物特徵：常綠灌木、葉互生，具短柄，卵披針形或長橢圓形，全緣或鋸齒緣；總狀花序頂生或腋出，花兩性亦有單性，花冠四裂，花小具清香。核果球形含一種子。

生長習性：產於全省低中海拔間葉樹林內。

利用部位：果實、花、根皮。

主要成分：桂花主要含有一紫羅蘭酮、芳樟醇、香葉醇、橙花醇、松油醇、一癸內酯、壬醇、一水芹烯等成分。

藥　　效：適合庭植美化、綠籬或大型盆栽、花曬乾可泡茶、作香料、亦可潤髮服食，可化痰生津且有美顏功效。

資料來源：台灣藥用植物手冊

黃花酢醬草

編號：TARI-237

中文科名：酢醬草科
英文科名：Oxalidaceae
學　　名：*Oxalis corniculata* L.
植物特徵：多年生草本，莖細而柔軟，成匍匐狀，節節生不定根，掌狀複葉，互生，總葉柄纖細而曲折，小葉3，倒心臟形，先端凹入，繖形花序腋生，花黃色，倒卵形，蒴果近圓柱形，熟時自行開裂，種子彈出。
生長習性：生於路邊、田園住宅及溝邊較濕潤處。
利用部位：全草。
主要成分：草酸鹽、枸櫞酸、酒石酸，莖含蘋果酸。
藥　　效：抑菌作用。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (5)

香林投

編號：TARI-238

中文科名：露兜樹科
英文科名：Pandanaceae
學　　名：*Pandanus odorus* Ridl.
植物特徵：常綠灌木，株高約30-70cm，叢生狀，葉劍形略凹，長約20-40cm，寬3-5cm，全緣，近先端處有數枚不明顯疏生短刺，不易開花，平行脈。
生長習性：性強健耐陰，葉色青翠，喜高溫多濕。
利用部位：全草。
主要成分：含鐵、鎂、鈣、維他命A 和C。
藥　　效：清熱去濕、消瘀、解毒。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

林投

編號：TARI-239

中文科名：露兜樹科
英文科名：Pandanaceae
學　　名：*Pandanus tectorius* (L.) Parkins
植物特徵：常綠灌木或小喬木。樹幹具環狀葉痕，上部多枝，下部多生氣根，入地後漸粗大成爲支持根。葉聚集枝端，作螺旋狀排列，線狀披針形如劍狀，長達130cm，寬3-6cm，基部漸闊而作鞘狀，先端長銳尖形，葉緣及中肋疏生銳刺。
生長習性：台灣全境海濱及蘭嶼、綠島多見自生。
利用部位：利用根、葉、花朵。
主要成分：根含酚類，氨基酸，糖類。花含揮發油：油中含methyl phenylethyl ether，dipentene，d-linalool，phenylethy acetate，citral，stearoptene，ester of phthalic acid等。
藥　　效：根有發汗解，熱利水化濕之效。葉芽有清熱，涼血，解毒之效。花有清熱利水，去濕熱，止熱瀉之效。果有補脾胃，固元氣，制伏亢陽，扶持衰土，狀精神，益血。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

樹薯

編號：TARI-240

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Manihot utilissima* Pohl.
植物特徵：落葉性亞灌木。花期5-7。果期8-10月。
生長習性：原產巴西。
利用部位：根。
主要成分：塊根含豐富澱粉。
藥　　效：清熱、解毒、殺蟲之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈4〉

百香果

編號：TARI-241

中文科名：西番蓮科
英文科名：Passiforaceae.
學　　名：*Passiflora delete* Sims
植物特徵：常綠蔓性藤本。莖幹具卷鬚，彈簧形。葉互生掌狀深裂，裂片三枚，卵形至橢圓形（幼株呈橢圓形而不分裂）。花腋生，具芳香，花冠圓形，萼片向外反捲如瓣狀；副冠二輪呈絲狀，柱頭三枚下垂。果實球形，熟時紫色或黃色。春至秋季開花。
生長習性：生長於低海拔山野，路旁。
利用部位：果。
主要成分：狀莖中含多種甾體化合物：薯蕷皂甘元(diosgenin)、薯蕷皂甘(dioscin)、蚤休皂甘甲及乙(pariphyllin A，B)。
藥　　效：有小毒。清熱解毒，消腫止痛。
資料來源：全國中草藥匯編

龍珠草

編號：TARI-242

中文科名：西番蓮科
英文科名：Passifloraceae
學　　名：*Passiflora foetida* L.
植物特徵：草質藤本，長達6m。莖柔弱，圓柱形，常被柔毛，具腋生卷鬚。葉互生，裂片先端具腺體；葉柄長 2-6cm；托葉細絨狀分裂，葉膜質，寬卵形至長圓狀卵形，長4.5-13cm，寬4-12cm，3淺裂，基部心形，邊緣不規則波狀，具緣毛及腺毛，兩面被絲狀毛及混生腺毛或腺點。聚繖花序退化而僅具花1朵，腋生，5數，白色或淡紫色，直徑2-3cm；苞片一至三回羽狀分裂，小裂片絲狀，先端具腺毛；萼片長圓形，背面近先端具一角狀附屬物；花瓣與萼片近等長；副花冠由3-5輪絲狀裂片組成，花絲基部合生，上部分離；子房橢圓形，花柱3-4。漿果卵圓形，直徑2-3cm，成熟時呈黃色。花期7-8月，果期翌年4-5月。
生長習性：生於低海拔至地的荒山草坡或灌叢中。
利用部位：全株、果實。
主要成分：西番蓮鹼。
藥　　效：清肺止咳，解毒消腫。
資料來源：中華本草(2)

敗醬草

編號：TARI-243

中文科名：敗醬科
英文科名：Valerianaceae
學　　名：*Patrinia scabiosaefolia* Fisch. ex Link
植物特徵：多年生草本，高達1m。地下莖細長，地上莖直立，密被白色倒生粗生或僅兩側各有1列倒生粗毛。基生葉簇生，卵圓形，邊緣有粗齒，葉柄長；莖生葉對生，卵形或長卵形，長4-10cm，寬 2-5cm，先端漸尖，基部楔形，1-2對羽狀分裂，基部裂片小；上部不裂，邊緣有粗齒，兩面有粗毛，近無柄。繖房狀圓錐聚繖花序，花序分枝及梗上密生或僅 2列粗毛；花萼不明顯；花冠白色，直徑4-6mm。瘦果倒卵形，基部貼生在增大的圓翅狀膜質苞片上，苞片近圓形。花期5-6月。
生長習性：生於山坡草地、路旁。
利用部位：根莖及根。
主要成分：敗醬皀（Patrinoside）、異敗醬烯、槲皮素、異鼠李素等。
藥　　效：清熱消炎，解毒排膿，祛瘀活血。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈下〉

紅雀珊瑚

編號：TARI-244

中文科名：大戟科
英文科名：Euphorbiaceae
學　　名：*Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit.
植物特徵：肉質灌木。株高可達1公尺，盆栽數十公分，成株叢生狀，葉披針形，莖葉有乳白色斑紋。冬至春季落葉後開花，花期長達2個月以上，杯狀聚繖花序，總苞鮮紅色，形似拖鞋，聚生枝頂。
生長習性：全省各地零星栽培。
利用部位：全株。
主要成分：全草含黃酮甘、酚類、氨基酸等。有毒。
藥　　效：全株清熱，解毒，鎮痛，止血，消炎．治腰痛，疥癬，跌打腫痛，外傷出血。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(1)

狼尾草

編號：TARI-245

中文科名：禾本科
英文科名：Gramineae
學　　名：*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spr.
植物特徵：多年生草本，桿叢生直立。穗狀圓錐花序，主軸硬，密生柔毛，具向上微小糙刺，成熟後成黑紫色，穎果扁平長圓形。
生長習性：生於山坡灌木叢邊或雜草叢中。
利用部位：根及根莖。
主要成分：全草含黃酮甘。葉含牡荊素，牡草素，肥皂草素。
藥　　效：明目、散血。
資料來源：中藥大辭典(下)

紫蘇

編號：TARI-246

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：Perilla frutescens Britton var. crispa Decaisne
植物特徵：爲一年生直立草本，高常1m；莖綠色或紫色，方柱形，有4鈍棱，被長柔毛。葉對生，草質，卵形或近圓形，長7-13cm，寬4.5-10cm頂端短尖或驟尖，基部?楔尖至圓，邊有撕裂狀粗鋸齒，兩面紫色，或僅下面紫色，上面紫綠色，被疏柔毛，下面被伏貼柔毛；葉柄長3-5cm。花秋季開放，紫紅色，排成腋生、密花、偏側的總狀花序；苞片闊卵形或近圓形，長約4mm，生有紅褐色腺點，無毛；果萼明顯增大長1.1cm，平伸或下垂，基部一邊腫脹；小堅果球形，徑1.5mm，褐色，有網紋。
生長習性：野地自生。
利用部位：葉。
主要成分：含揮發油，油中主要爲l-perillaldehyde,l-perilla-alcohol,檸檬烯，芳樟醇，薄荷腦，丁香烯，並含elshottziaketone，紫蘇酮，丁香酚等。
藥　　效：歸肺、脾經。解表散寒，行氣和胃。
資料來源：實用中草藥彩色圖集（1）

酪梨

編號：TARI-247

中文科名：樟科
英文科名：Lauraceae
學　　名：*Persea americana*
植物特徵：常綠喬木。高達10m。葉互生，柄長約4cm ，葉片矩圓形、橢圓形、卵形倒卵形，長8-20cm，寬5-8cm，基部漸尖呈楔形，先端急尖或突尖，全緣，背面稍帶粉白色，羽狀脈。
生長習性：原產熱帶美洲。
利用部位：果實、葉。
主要成分：果肉中含約20%之脂肪，蛋白質16%，糖類約3%。另含perseitol。
藥　　效：果肉可供食用、工業、醫藥之皮膚軟膏及化 妝品用、葉有利尿、緩下、經之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉

歐芹

編號：TARI-248

中文科名：繖形科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Petroselinum crispum*
植物特徵：二年生草本，植株呈叢生狀，高約30-40公分，葉緣深缺刻卷曲波浪狀，深綠色，具香味，夏季開出黃色小花。
生長習性：適合日照充足排水良好的環境。
利用部位：莖、葉。
主要成分：含高量之維生素A、C及鐵質。
藥　　效：具抗氧化作用、防止膽固醇的沈積、避免血液凝集成塊及減少動脈硬化及預防心臟病的發生。可保護眼睛、防止眼部神經的退化。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉

前胡

編號：TARI-249

中文科名：繖形科
英文科名：Umbelliferae
學　　名：*Peucedanum decursivum* (Miq.)Maxim.
植物特徵：多年生草本，高1-2m。葉1回至近2回羽狀分裂，小葉柄的邊緣翅狀延長，最終裂片橢圓形，長圓狀披針形至倒卵狀橢圓形，長5-13cm，寬2.5-5.5cm，邊緣有細而規則的鋸齒；莖上部葉片成膨大的紫色葉鞘。複傘形花序，頂生或腋生；小總苞數個，披針形；花深紫色，成近球形的小傘形花序，花梗絲線狀。果實卵圓形至卵狀長橢圓形。花期8-9月，果期10月。
生長習性：生於山坡、林緣或灌叢、草地。
利用部位：根。
主要成分：含紫花前胡甘（nodakenin）、紫花前胡素（decursin）、紫花前胡次素（decursidin）、印枳素（marmesin)、3'-異戊酚 4'0—當歸醯3 ， 4 - 二氫花椒樹皮素（3'—isovaleroyl-0—angeloyl-3'，4'—dihydroxanthyletin)、傘形花內酯（umbelliferone)等。
藥　　效：有宣肺化痰、止咳的功能。
資料來源：實用中草藥(1)

白丑牛

編號：TARI-250

中文科名：旋花科
英文科名：Convolvulaceae
學　　名：*Pharbitis nil* (Linn.) Roth
植物特徵：一年生攀緣性草本，莖分枝，葉互生，具長柄，葉片心臟形，裂葉狹披針形，全緣無毛，花冠漏斗狀，蒴果球形，種子5-6顆，白色、淺黃色。
生長習性：亞洲熱帶地區。
利用部位：種子。
主要成分：含pharbitic acid、ipurolic acid、葡萄糖和鼠李糖等化合物。
藥　　效：瀉下、利水、除濕熱。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

石莧(鴨舌紅)

編號：TARI-251

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Phyla nodiflora* (Lunn.) Greene
植物特徵：多年生草本。莖匍匐地上，細長，長20-100cm，節上隨處生不定根，並多分枝，被短柔毛。葉對生，幾無柄，葉片倒卵形或匙形，兩面被毛，粗糙感，僅中肋明顯。花序梗直立，花序圓柱形，果實倒卵形，花果期夏至冬季。
生長習性：台灣全境平野至山地散見群生，尤以海岸及離島常見大群落。
利用部位：全草。
主要成分：全草含黃酮成分；主含過江藤素、豆固醇葡萄糖甘。
藥　　效：治癰疽腫毒、牙疳、月經不調、經期腰痛、瘋狗咬傷等。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

舞草

編號：TARI-252

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Jasminum samba* (Linn.) Aiton.
藥　　效：根、莖祛風除濕，舒筋活血，治風濕病，筋骨酸痛。

牌錢樹

編號：TARI-253

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Phyllodium pulchellum* (L.) Desv.
[*Desmodium pulchellum* (L.) Benth.]
植物特徵：半灌木，高0.5-1.5公尺。根細而彎曲。莖直立，分枝多而纖細，被有柔毛。三出複葉互生，葉柄短，有鑽形托葉1片，中間小葉大，橢圓狀卵形或披針狀卵形，長5.5-11.5cm，寬 2.5-6.5cm，先端稍鈍，基部寬楔形，邊緣淺波狀，下面脈上被短柔毛，兩側小葉較小。秋季葉腋生花，花序長達30cm，葉狀苞片約30對排爲總狀，兩兩對生，好像兩串錢；苞片近圓形，直徑約1cm，每對苞片內著生由2至數朵花組成的繖形花序；蝶形花冠白色，長約6mm。莢果僅2莢節，莢節處緊縮，長約6mm，先端有長喙，邊緣被毛。種子細長，近矩形。
生長習性：生於山坡林下、路旁及灌叢中。
利用部位：根和葉。
主要成分：全株含生物鹼類：蟾酥特寧(bufotenine,$C_{12}H_{16}ON_2$)、蟾酥特寧甲醚(bufotenine-O-methyl ether，$C_{13}H_{18}ON_2$)約0.2～0.5%。N,N-二甲基色胺(N,N-dimethyltryptamine，$C_{12}H_{16}N_2$)及其氮氧化物5-甲氧基-N-甲基色胺，並含有5-甲氧基-N,N-二甲基色胺($C_{13}H_{18}ON_2$)和5-甲氧基-3-甲氧基乙基引朵($C_{12}H_{16}ON_2$)。此外，尚含有禾草鹼(gramine，$C_{11}H_{14}N_2$)等。根顯生物鹼、酚類、有機酸和氨基酸反應
藥　　效：感冒發熱，瘧疾，肝炎，肝硬化腹水，血吸蟲病肝脾腫大，風濕疼痛，跌打損傷。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (1)

倒地鈴

編號：TARI-254

中文科名：茄科
英文科名：Solanaceae
學　　名：*Physalis angulata* L.
植物特徵：一年生草本，高30-60cm。莖通常橫臥而斜上，多分枝，有稀疏細軟毛或近光滑。葉互生，柄長1-3cm；葉片寬卵形或長圓形，長4-8cm，寬3-5cm，先端短尖，基部闊楔形，邊全緣或具少數不規則的鋸齒，上面疏生短毛。7-9月開花，花單生葉腋，具梗，下垂，花梗長約5mm，被疏毛。花萼鐘狀，長約5mm，先端5裂，基部成平截五角狀；花冠短鐘狀，淺黃色，直徑5-7mm；雄蕊5；子房2室，花柱線形。漿果球形，黃色，宿萼綠色，增大如燈籠，被毛，有顯明而突出的稜角5條，包圍漿果之外。種子多數。
生長習性：多生於田園陰濕肥沃的地方或山坡、路旁。
利用部位：根或全草。
主要成分：莖葉含酸漿苦味素(physalin)D、E、F、G、H、I、J、K，又據報道全草含酸漿紅素(physalien，C72H11604)。種子含脂肪油約21%，油中含亞油酸(約75%)及油酸(約12%)。
藥　　效：咽喉腫痛，腮腺炎，急慢性氣管炎，肺膿瘍，痢疾，睪丸炎，小便不利；外用治膿泡瘡。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (1)

冷水麻

編號：TARI-255

中文科名：蕁麻科
英文科名：Urticaceae
學　　名：*Pilea microphylla* L. Liebm
植物特徵：一年生草本；莖株多分枝，直立、橫臥或斜生，全株無毛，柔軟多汁，株高不超過10公分；葉分爲兩型，大小不同，大者卵狀橢圓形或匙形，長約5-6公厘，葉柄較葉身爲短，全緣。小型葉簇生節部，長度不及大型葉之半；花朵小型，成簇集生於葉腋，黃綠色或帶有紅暈，雌雄同株或異株；雄花花被4片，雄蕊4枚，雌花花被3片，柱頭毛筆狀；瘦果卵圓形或長橢圓形。
生長習性：庭園花圃。
利用部位：全草。
主要成分：含維生素C。
藥　　效：外敷可治火燙傷、無名腫毒。
資料來源：中華本草(2)

半夏

編號：TARI-256

中文科名：天南星科
英文科名：Araceae
學　　名：*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.
植物特徵：多年生草本，地下有球形塊莖，葉子心狀箭形，佛焰花序由根部長出，果實爲漿果。
生長習性：生於荒地、田邊、山坡草坡或疏林下。
利用部位：塊莖。
主要成分：天門冬氨酸、精氨酸、高龍膽酸及葡萄糖甘。
藥　　效：具有燥濕化痰、降逆止嘔、消痞散結之功能。用於痰多咳喘、痰飲眩悸、風痰眩暈、痰厥頭痛、嘔吐反胃、胸脘痞悶、梅核氣等症;生用外治癰腫痰咳。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(下)

五葉松

編號：TARI-257

中文科名：松科
英文科名：Pinaceae
學　　名：*Pinus morrisonicola* Hayata
植物特徵：大喬木，針葉5根一束。松針長4-9cm。 毬果長型長7-10cm ；種鱗之鱗盾成菱形；種子有翅。松樹的樹皮在樹齡屆22年後開始出現龜甲狀之裂紋，越老越明顯。
生長習性：生於林中，分佈於中央山脈海拔300-2000m之山區。
利用部位：瘤狀節或分枝。
主要成分：纖維素、木質素、少量揮發油及樹脂。
藥　　效：1.局部刺激作用 2.興奮作用 3.油松節尚有祛痰和利尿作用。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(上)

三白草

編號：TARI-258

中文科名：胡椒科
英文科名：Piperaceae
學　　名：*Piper betle* Linn.
植物特徵：多年生藤本。老藤稍木質，長達數公尺，節上常生不定根。葉互生，葉稍革質而厚，寬卵形或心形。穗狀花序，漿果與花序軸和生成肉質果穗。花果期全年皆有。4-11月爲盛產期。
生長習性：中南部栽培，中部以北稀少。
利用部位：果穗、葉。
主要成分：根含β-穀固醇。葉含揮發油：內含胡椒酚，蔞葉酚，烯丙基焦性兒茶酚，香荊芥酚，丁香油酚，對一聚繖花素，8-桉葉素，丁香油酚甲醚，石竹烯，畢澄茄烯。
藥　　效：果穗有溫中、下氣、散結、消痰之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

大車前

編號：TARI-259

中文科名：車前科
英文科名：Plantaginaceae
學　　名：*Plantago asiatica* L.
植物特徵：多年生草本，高10-30cm，光滑或稍有毛。根狀莖短，有多數鬚根。葉基出，叢生，直立或展開；葉柄幾與葉片等長，基部擴大；葉片寬橢圓形或卵形，長4-15cm，寬3-9cm，有5-7條平行的弧形脈，邊全緣或有不規則的波狀淺齒。夏、秋間開淡綠色小花，花葶數條，從葉叢中抽出，有縱稜；穗狀花序長可達20cm；每花有1三角形宿存苞片；花萼基部稍合生，萼片4，花冠管卵形，先端 4 裂，裂片三角形，向外反捲；雄蕊4個，花藥先瑞有三角形突出物；雌蕊1個，花柱有毛。蒴果卵狀田錐形，近中部周裂；種子細小，但在同屬植物的種子中算是比較大的，4-9粒，徑1-2mm，黑褐色。商品習稱"大粒車前"。
生長習性：生於山野、荒地、路旁、河邊陰濕地。
利用部位：種子和全草。
主要成分：含車前甘、桃葉珊瑚甘、烏索酸、β-谷甾醇、正卅一烷等。
藥　　效：清熱利尿、祛痰止咳、明目。
資料來源：全國中草藥匯編

桔梗

編號：TARI-260

中文科名：桔梗科
英文科名：Campanulaceae
學　　名：*Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC.
植物特徵：多年生草本，高30-90cm，全株光滑無毛。根肉質、圓柱形，或有分枝，莖直立，單一或分枝。葉近於無柄，生於莖中、下部的葉對生或3-4片輪生，莖上部的葉有時爲互生；葉片卵狀披針形，長3-6cm，寬1-2.5cm，先端尖，基部楔形或近圓形，邊緣有鋸齒。花期7-9月，果期8-10月。
生長習性：野生於山坡草叢中，宜溫和濕潤的氣候，以排水良好、土層深厚肥沃，富含腐植質的砂質壤土爲佳。
利用部位：根部。
主要成分：根含遠志酸、桔梗皂甘元、葡萄糖、菠菜甾醇、菊糖、桔梗聚糖及三帖類物質。
藥　　效：祛痰排膿、治外感咳嗽、咽喉腫痛、肺癰吐膿、痢疾腹痛、降血糖、抑制皮膚癬菌。
資料來源：中藥大辭典(下)

到手香

編號：TARI-261

中文名稱：到手香
中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Plectranthus amboinicus* (Lour.) Spreng
植物特徵：多年生草本。全株被毛，株高30-120cm，多分枝或叢生，基部臥伏，木質化，上部斜伸或直立，淡綠色。葉對生，葉片肥厚肉質狀，心形或近心形，基部楔形或廣楔形、心形，先端鈍圓形或突尖，粗鋸齒緣。
生長習性：原產東南亞及菲律賓等熱帶地區。
利用部位：全草。
主要成分：全草含揮發油。
藥　　效：全草有解表清暑，化濕健胃，涼血解毒，消腫止癢之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

欒樨

編號：TARI-262

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Pluchea indica* (L.) Less
植物特徵：直立灌木，高2-3m，徑5-8mm，分枝或上部多分枝，有明顯細溝紋，幼枝被短柔毛後脫落。下部葉無柄或近無柄，葉片倒卵形或闊倒卵形，長5-7cm，寬2.5-3cm，基部漸狹成楔形。頂端鈍圓、鈍或具短尖，表面被粉狀短柔毛，背面無毛或沿中脈被疏毛，有時僅具泡狀小突點，中部和上部葉無柄，葉片倒卵形或倒卵狀長圓形，長2.5-4.5cm，寬1-2cm，基部楔形，頂端鈍或渾圓，邊緣具細齒，兩面被短柔毛。頭狀花序徑3-5mm，在莖枝頂組成傘房狀，花紫色-粉紅色，花序梗纖細，長3-5mm，被短柔毛；總苞卵狀鐘形，長約6mm，總苞片5-6層；外層的卵形或寬卵形，長3-4mm，有緣，背面被短柔毛，內層的狹線形，長4-5mm，頂端短尖，無毛或有時上半部有疏緣毛；緣花花冠絲狀，雌性，長約4mm，中央管狀花少數，兩性，長5-6mm，檐部擴大，頂端5淺裂。瘦果圓柱形。有4稜，長1.2-1.8mm，被疏毛；冠毛白色，宿存，與花冠等長；兩性花的冠毛常於下部聯合成寬帶狀。花果期全年。

生長習性：生於海濱沙地或近潮水的空曠地。
利用部位：全株。
主要成分：闊苞菊甘、葡萄糖甘、闊苞菊醇。
藥　　效：根：治療風濕骨痛，坐骨神經痛，筋骨酸痛，抽痛，月經疼痛。葉：具有解毒，消腫之功效。
資料來源：常見中草藥第五輯

白花藤(烏面馬)

編號：TARI-263

中文科名：藍雪科
英文科名：Plumbaginaceae
學　　名：*Plumbago zeylanica* L
植物特徵：攀狀亞灌木，高2-3公尺。莖多分枝，有細稜，節上帶紅色，光滑無毛。葉互生，葉柄基部擴大而抱莖；葉片紙質，矩圓狀卵形至卵形，長4-10 cm，寬1.5-5cm，先端短尖或漸尖，基部漸窄，全緣或微波狀，無毛。夏季開花，穗狀花序頂生，長5-25cm；花萼管狀，長約1cm，具5稜，密被長腺毛，有粘性；花冠高腳碟狀，白色或白而略帶藍色，花冠管纖弱，裂片5，廣展；雄蕊5，與花冠分離。蒴果膜質，蓋裂。
生長習性：多生於氣候炎熱的地區，常見於陰濕的小溝邊或村邊路旁曠地。
利用部位：根、葉。
主要成分：葉和根含有毒成分藍雪素即磯松素(plumbagin，$C_{11}H_8O_3$)。尚含有氨基酸、白花丹精及白花丹酸、β-谷甾醇、香莢蘭酸等。
藥　　效：根：風濕骨痛，跌打腫痛，胃痛，肝脾腫大。葉：外用治跌打腫痛，扭挫傷，體癬。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

緬梔

編號：TARI-264

中文科名：夾竹桃科
英文科名：Apocynaceae
學　　名：*Plumeria ribra* L. cv. *Acutifolia*
植物特徵：灌木至小喬木，高3-7公尺，小枝肥厚，光滑無毛，折斷有白色乳汁流出。葉互生，集於枝頂；稍革質，葉片倒卵披針形至矩圓形，長20-40cm，寬達7cm，先端短尖或漸尖，基部漸窄成柄，全緣或微波狀,羽狀側脈在近葉緣處明顯連結成網，兩面均光滑無毛。夏秋間於枝頂抽出聚傘花序，花極香，大而美麗；花冠基部連合成管，外面白色而略帶淡紅色，內面基部黃色，長5-6cm，花冠裂片5，倒卵形，比花冠管爲長；雄蕊5，花絲短與花冠管基部合生。蓇葖果條狀矩圓形。
生長習性：各地公園、庭院常見栽培供觀賞。
利用部位：花。
藥　　效：預防中暑，腸炎，細菌性痢疾，消化不良，小兒疳積，傳染性肝炎，支氣管炎。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(2)

金絲草

編號：TARI-265

中文名稱：金絲草
中文科名：禾本科
英文科名：Gramineae
學　　名：*Pogonatherum crinitum* (Thunb.) Kunth
植物特徵：多年生小草本，高10-30cm，稈叢生，直立或基部稍傾斜，纖細，節明顯，節上生白毛，少分枝。葉互生，排成2列，葉片扁平，條狀披針形，長2-4cm，寬1-3mm，先端尖，兩面和葉緣均有微毛，葉鞘禿淨，鞘口有毛。5-9月開花，穗狀花序從稈頂生出，柔弱而微彎曲，長1.5-3cm，小穗成對，花乳白色，第二穎約長於第一穎，而第二外穎稍短於第一穎，穎片及外穎頂端延伸成細弱彎曲的芒，構成穗軸上密生金黃色的柔軟長芒，形似貓尾。穎果長橢圓形。
生長習性：生於河邊、牆縫、山坡和曠野潮濕地帶。
利用部位：全草。
主要成分：全草揮發油中主要含2,3-二甲基-5-甲氧基苯酚、黃樟醚、細辛醚、龍腦、甲基丁香酚、橙花叔醇、2,3,4,5-四甲氧基苯丙烯、茴香酸丙酯、鄰苯二甲酸、二丁酯。
藥　　效：感冒高熱，中暑，尿路感染，腎炎水腫，黃疸型肝炎，糖尿病，小兒久熱不退。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈下〉

左手香

編號：TARI-266

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*pogostemon cablin*
植物特徵：左手香屬唇形花科多年生草本，左手香株高約15-30公分，全株密被細毛，具強烈特殊辛香味。葉肥厚，對生，廣卵形，先端純圓或銳，齒狀緣有點上捲。
生長習性：疏鬆肥沃之腐質土或砂質壤土最佳，排水需良好，耐蔭、耐旱，性喜高溫。
利用部位：嫩葉或心葉。
主要成分：全草含揮發油。
藥　　效：可治癒咳嗽喉嚨痛與聲音沙啞。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(4)

廣藿香

編號：TARI-267

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Pogostemon cablin*
植物特徵：多年生草本或半灌木。葉揉之有清淡的特異香氣，有毛茸。花冠唇形，淡紅紫色。夏秋季枝葉茂盛時採割。
生長習性：產於亞熱帶地區，台灣有栽培。
利用部位：葉子。
主要成分：含倍半甘類 (Sesquiterpene)，廣藿香奧醇(Pogostol)及其他精油。
藥　　效：解熱、散風寒、健胃、止瀉、止嘔、理氣。
資料來源：中草藥彩色圖譜

杜若

編號：TARI-268

中文科名：鴨跖草科
英文科名：Commelinaceae
學　　名：*Pollia japonica* Thunb.
植物特徵：多年生直立或上升草本，高50-90釐米，有細長的橫走根莖。葉常聚集於莖頂，長11-18釐米，寬4-6.5釐米，頂端漸尖，基部漸狹，暗綠色，表面粗糙，背面有細毛；無柄或基部漸狹而成帶翅的葉柄。頂生圓錐花序常由輪生的聚傘花序組成，輪與輪之間較疏離，有長總梗，梗有白色細毛，花柄長2-4毫米，有1膜質披針形的苞片；花紅色。果圓球形，直徑5-7毫米，成熟時暗藍色。花期6-7月，果期8-10月。
生長習性：分佈於1000公尺以下低海拔山區闊葉林下。
利用部位：全草。
藥　　效：敷治跌打損傷，也可治蛇蟲咬傷。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈5〉

遠志

編號：TARI-269

中文科名：遠志科
英文科名：Polygalaceae
學　　名：*Polygala tenuifolia* Willd.
植物特徵：多年生草本，高30cm，根圓柱形，長而彎曲，莖直立或斜生，由基部叢生。葉互生，線形或狹線形，長1-4cm，寬1-3cm，全緣。總狀花序花稀疏，花瓣3，淡紫色。蒴果卵圓形而扁，先端微凹，無毛。種子卵形，扁平，黑色，被白色絨毛。花期4-5月，期5-6月。
生長習性：生於向陽山坡，路旁或沙岸旁。
利用部位：根。
主要成分：根皮含酸性皂甘、遠志皂甘、結晶性遠志素、脂肪油、樹脂等。
藥　　效：有益智安神、散鬱化痰、消腫的功能。用於神經衰弱、心悸、健忘、多夢失眠、咳嗽多痰、支氣管炎、腹瀉等。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(上)

栝蔞

編號：TARI-270

中文科名：葫蘆科
英文科名：Cucurbitaceae
學　　名：*Trichosanthes kirilowii* Maxim.
植物特徵：多年生草質藤本，長達10m。塊根肥厚，莖攀緣，多分枝，表面有淺縱溝，光滑無毛；捲鬚腋生，細長，先端2歧。葉互生，葉片近圓形或心形，長寬各8-20mm，長爲5-7淺裂或中裂，裂片倒卵形至橢圓狀披針形，先端急尖或短漸尖，邊緣有疏齒或再做淺裂，幼時兩面疏生柔毛，老時下面有粗糙斑點。花期7-8月，果期9-10月。
生長習性：生長於山坡草叢、林邊、陰濕山谷中，喜溫暖濕潤、土層深厚、肥沃疏鬆、排水良好的砂質壤土。
利用部位：果實。
主要成分：果實含三帖皂甘、有機酸、樹脂、糖類和色素。種子含脂肪油。
藥　　效：潤肺、化痰、散結、滑腸。治痰熱咳嗽、胸痹、結胸、肺萎咳血、消渴、黃疸、便秘、癰腫初起。
資料來源：中藥大辭典(下)

油點草

編號：TARI-271

中文科名：百合科
英文科名：Liliaceae
學　　名：*Tricyrtis macropoda* Miq.
植物特徵：莖直立，高達1米，稍曲折，基部無毛，上部有短粗毛。葉片長橢圓形至寬橢圓形，長8-15釐米，寬3.5-8釐米，基部圓形或微心形，無柄，不抱莖或略抱莖，背面有毛，邊緣有刺毛。繖房狀聚繖花序頂生或著生上方葉腋；花序梗有柔毛和腺毛；花被片白色或淡紅色，有紫斑，長1.5-2釐米，開花時反轉，外輪花被片寬倒披針形，基部膨大成囊狀，內輪狹披針形；雄蕊長於花被片，上部捲曲，花果期9月。
生長習性：生山坡、溝邊雜草中或竹林下。
利用部位：全草。
主要成分：全草含醣類，根莖含草酸鈣。
藥　　效：全草治喉痛，扁桃腺炎。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈3〉

葫蘆巴

編號：TARI-272

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Trigonella foenum-graecum* Linn.
植物特徵：一年生草本。株高30-50cm，全株被稀疏毛。莖直立，分枝成叢生，中空，表面天藍色。葉互生，柄長6-12mm，托葉與葉柄連合，卵形，先端尖，三出複葉，小柄長1-2mm，小葉卵形、長卵形至長圓狀披針形，長1-3cm，寬1-1.5cm，基部狹尖，先端鈍形，葉片上半部鋸齒緣，下部近全緣，兩面疏被毛。花1-2朵腋生，幾無梗。花萼筒狀，萼齒披針形，外被長柔毛。花冠蝶形，長13-18mm，白色或黃白色，基部稍帶紫堇色，旗瓣長圓形，頂端深波切狀，龍骨瓣偏匙形，翼瓣耳形。雄蕊10枚，1枚離體。子房線形，上端漸細，柱頭稍彎曲。莢果長扁筒形，長6-12cm，寬約5mm，直或稍彎曲，被毛，先端漸細尖形。種子多數，腎狀長橢圓形，堅硬，長約4mm；淡棕褐色。花期3-6月。果期4-7月。
生長習性：溫帶地區。
利用部位：種子。
主要成分：種子含葫蘆巴鹼(trigonelline)、膽鹼(choline)、龍膽鹼(gentianine)、番木瓜鹼(carpaine)、薯蕷皂甘(dioscin)。
藥　　效：種子有補腎陽、袪寒濕、滋養、強精、止痛之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

土半夏

編號：TARI-273

中文科名：天南星科
英文科名：Araceae
學　　名：*Typhonium divaricatum* (L.) Decene.
植物特徵：多年生草本，地下有球形塊莖，葉子心狀箭形，佛焰花序由根部長出，果實爲漿果。
生長習性：生於荒地、田邊、山坡草坡或疏林下。
利用部位：塊莖。
主要成分：天門冬氨酸、精氨酸、高龍膽酸及葡萄糖甘。
藥　　效：具有燥濕化痰、降逆止嘔、消痞散結之功能。用於痰多咳喘、痰飲眩悸、風痰眩暈、痰厥頭痛、嘔吐反胃、胸脘痞悶、梅核氣等症；生用外治癰腫痰咳。
資料來源：常見中草藥第三輯

榆樹

編號：TARI-274

中文科名：榆科
英文科名：Ulmaceae
學　　名：*Ulmus pumila* L.
植物特徵：落葉喬木，高達20m。樹皮暗灰褐色，粗糙，有縱溝裂。小枝柔軟有毛，淺灰黃色。單葉互生，花先葉開放，生於去年枝的葉腋，簇生。花期3-4月，果期4-6月。
生長習性：生於河堤、田埂和路邊。
利用部位：樹皮、根皮的韌皮部、果實。
主要成分：β-穀甾醇、植物甾醇、鞣質、硫胺素等。
藥　　效：利水、通便、消腫的功效。用於小便不通、淋濁、丹毒等。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(上)

通天草

編號：TARI-275

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Uraria crinita* Desvaux
植物特徵：多年生木質草本，株高50-100cm，單一或多枝成叢生狀，被粗毛，葉互生，奇數羽狀複葉，葉片橢圓形，全緣。花冠淡紫色至紫色，種子腎形。
生長習性：臺灣全境平野至低海拔山區之荒地或山坡地雜草叢中。
利用部位：根部或全株。
主要成分：全草含黃酮甘。葉含牡荊素，牡草素，肥皂草素。
藥　　效：全草有殺蟲、消積、健脾胃、助消化、潤燥解熱、活血通絡、散瘀止血、解毒消腫之效。治小兒發育不良、小兒慢脾症、脾胃虛弱、胃病、吐血、咳血。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(3)

虱母

編號：TARI-276

中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Urena lobata* L.
植物特徵：多年生亞灌木狀草本，高約1m。莖直立，密被白色毛茸。單葉互生，葉柄長1-2cm；托葉2，條形，被毛；葉片形狀、大小差異較大，卵狀三角形，卵形至圓形，長4-7cm，寬2-6cm，先端鈍，基部心形，有時寬楔形或鈍圓，不裂或具3-5淺裂，不超過葉的中部。邊緣有不規則重鋸齒，沿葉緣內面有顏色較淺的斑痕，上面被柔毛，下面有星狀絨毛，掌狀主脈3-7條。夏秋葉腋生花，有花梗；副萼5；花瓣5，倒卵狀橢圓形；長約1cm，淡紅色，先端鈍圓；雄蕊多數，基部連合成筒；雌蕊柱頭10裂。蒴果球形，直徑近1cm，分果有鉤狀刺毛。

生長習性：生於山坡、路旁草叢或灌木叢中，為常見之小灌木。目前台灣中部有少部份栽培供藥用。
利用部位：全草、根。
主要成分：全草顯酚類、甾醇及氨基酸反應。地上部分含槲皮素(quercetin)。
藥　　效：根：風濕關節痛，感冒，瘧疾，腸炎，痢疾，小兒消化不良，淋症，帶下，月經不調，跌打腫痛，喉痺，乳癰，瘡癤，毒蛇咬傷。葉：外用治跌打損傷，骨折，毒蛇咬傷，乳腺炎。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(2)

白花虱母草

編號：TARI-277

中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Urena lobata* Linn
植物特徵：多年生亞灌木，小枝及葉柄均被有星狀毛茸；葉形變化很大，生長於基部者常爲圓形且呈分裂狀；中央部位者則呈卵形，且較大；生長在上部者則爲卵形或卵狀橢圓形，具有規則的鋸齒；托葉線形或披針形；夏秋季開花，花單立，粉紅色，上花萼鐘形，花萼5裂，被星狀毛；蒴果徑約1cm，密生星狀毛及鉤刺，能附著人畜。
生長習性：全島低海拔山野及郊區荒廢地。
利用部位：根和全草(葉)。
主要成分：全草顯酚類、甾醇及氨基酸反應。地上部分含芒果甘(mangiferin)、槲皮素(quercetin)。
藥　　效：根：風濕關節痛、感冒、瘧疾、腸炎、痢疾、小兒消化不良、淋證、帶下、月經不調、跌打腫痛、喉痺、乳癰、瘡癤、毒蛇咬傷。葉：外用治跌打損傷、骨折、毒蛇咬傷、乳腺炎。
資料來源：全國中草藥匯編

王不留行

編號：TARI-278

中文科名：石竹科
英文科名：Caryophyllaceae
學　　名：*Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke
植物特徵：一年生草本，高30-70cm。莖直立，莖節膨大。葉對生，葉片卵狀披針形或卵狀橢圓形，全緣;無柄。聚傘花序頂生；花瓣5，淡紅色，倒卵形；種子多數，球形，表面黑色，有明顯的顆粒狀突起。花期4-5月，果期6月。
生長習性：生於平原或山地，以麥田中生長最多。
利用部位：乾燥成熟種子。
主要成分：種子含多種皂甘、王不留行黃酮甘、生物鹼和香豆素類化合物。
藥　　效：用於乳汁不下、經閉、痛經、乳癰腫痛。
資料來源：中國本草彩色圖鑑(中)

鐵馬鞭

編號：TARI-279

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Verbena officinalis* L.
植物特徵：多年生草本。全草深綠色。莖方形瘦長，高二、三尺，有短剛毛。葉對生，卵形至矩圓形，長一、二寸，先端尖，基部楔形，邊緣有不規則粗鋸齒和三深裂，背脈突起。夏秋開花，花軸頂生和腋生，穗狀花序，長八、九寸，先花柄，有苞片，花冠唇形分裂，淡紫色或藍色。結小堅果。
生長習性：山野村莊路旁曠地。
利用部位：全草。
主要成分：全草含馬鞭草甘(verbenalin)及5羥基馬鞭草甘；另含苦杏仁酶、鞣質；葉又含腺甘(adenoside)、β胡蘿蔔素。
藥　　效：內服破血去瘀，消脹利尿；外用消腫殺蟲。
資料來源：中藥大辭典(下)

紫花地丁

編號：TARI-280

中文科名：堇菜科
英文科名：Violaceae
學　　名：*Viola yedoensis* Makino
植物特徵：多年生草本，無地上莖，株高4-10cm。根莖稍粗。葉叢生。托葉長約2.5cm，先端分離部分呈線狀披針形或披針形，邊緣具疏齒或全緣；葉柄具狹翼，被短毛；葉舌形，長圓形或長圓狀披形，基部截形、鈍形或楔形，邊緣有平圓齒，被短毛，果期葉片長可達10cm，寬達4cm；萼片5，披針形或卵狀披針形，先端漸尖，邊緣具膜質狹邊，基部附屬物短；花瓣4，紫色或紫堇色，倒卵形或長圓形，花距長管狀，末端微向上彎，側瓣無鬚毛；雄蕊5，花藥結合，花絲寬短；子房無毛，花柱棍棒狀，柱頭頂面略平。種子多數，長圓形棕黃色，光滑。花期3-4月，果期4-9月。
生長習性：生於路旁、林緣、草地、灌叢、荒地。
利用部位：全草。
主要成分：全草含黃酮類、蠟。
藥　　效：全草味苦、微辛、性寒。有清熱解毒、散瘀消腫的功能。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(上)

黃荊

編號：TARI-281

中文科名：馬鞭草科
英文科名：Verbenaceae
學　　名：*Vitex negundo* L.
植物特徵：半落葉性小灌木。小枝方形，密生灰白色絨毛。葉對生，掌狀複葉，有長柄，小葉3-5片，呈橢圓狀卵形至披針形，全緣或略有鋸齒，背面密生白色絨毛。圓錐花序頂生，花呈淡紫色，十分淡雅。蒴果細小。
生長習性：全島低山地及平野、海岸。
利用部位：莖、種子。
主要成分：含帖類、黃酮類、強心甘。
藥　　效：根及幹治風濕。枝條退熱、敗毒、治疟腮、瘡腫牙痛。枝葉治腹痛、腸風、驚風。果實治傷風感冒。
資料來源：中草藥彩色圖譜

南美蟛蜞菊

編號：TARI-282

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Wedelia chinensis* (Osbeck) Merr.
植物特徵：多年生草本，矮小。莖匍匐，上部近直立，基部各節生不定根，長15-50 cm，基部徑約2mm，分枝，疏被短而壓緊的毛。葉對生；無柄或短葉柄；葉片條狀披針形或倒披針形，長3-7cm，寬7-13mm，先端短尖或鈍，基部狹，全緣或有1-3對粗疏齒，兩面密被伏毛，中脈在上面明顯或有時不明顯，主脈3條，側脈1-2對，無網狀脈。頭狀花序單生於枝端或葉腋，直徑1.5-2.5 cm，具長6-12cm的細梗；總苞鐘形，寬約1cm，長約12mm；總苞片2層，外層葉質，綠色，橢圓形，內層較小，長圓形；花托平，托片膜質；花異型；舌狀花黃色，舌片卵狀長圓形，先端2或3齒裂；筒狀花兩性，較多黃色，花冠近鐘形，向上漸擴大，簷部5裂，裂片卵形。瘦果，倒卵形，長約4mm；有3稜或兩側壓扁；無冠毛，而有具淺齒的冠毛。花期3-9月。
生長習性：臺灣平野至海濱之濕潤地、溝旁、田畔多見群生。
利用部位：全草。
主要成分：含三十烷酸、二十四烷酸、豆甾醇、豆甾醇葡萄糖、左旋-貝殼杉烯酸。葉含蟛蜞菊內酯、異黃酮類化合物。
藥　　效：有清熱，解毒，祛瘀，消腫之效。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑（1）

蟛蜞菊

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Wedelia trilobata* A. S. Hitchc
植物特徵：多年生草本植物，原產於美國佛州南方及熱帶美州。莖匍匐蔓延，長可及1.8m以上；由節處容易發根，覆蓋性良好。葉橢圓至倒卵形，先端三裂，亦有全緣葉或鋸齒葉緣，頭狀花序直徑不及2公分，單生於枝條頂端，呈鮮黃色單瓣型。
生長習性：性喜高溫、濕潤和陽光充足或半陰環境。其耐鹽性佳、抗強風、耐旱性佳、耐寒性佳、耐陰性佳。
利用部位：全草。
主要成分：含三十烷酸、二十四烷酸、豆甾醇、豆甾醇葡萄糖、左旋-貝殼杉烯酸、含蟛蜞菊內酯、異黃酮類化合物。
藥　　效：全草清熱解毒、治肺炎、氣管炎、搗爛敷蛇傷。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑（1）

蒼耳

編號：TARI-284

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Xanthium strumarium* L.
植物特徵：一年生草本，高40-100cm。全株密被白色短毛。莖直立、粗糙，微有稜條，表面青綠色，散布黑褐色斑點，近根部略呈紫色，上部有分枝。葉互生，具長柄，葉片不規則三角形，長6-10cm，寬5-10cm，先端尖，基部稍呈心形，邊緣3-5淺裂，有不規則粗齒，兩面被短毛。夏秋季開花，頭狀花序幾無梗，腋生、頂生或聚生；花單性，黃綠色，雌雄同株；雄花序球狀，生於枝梢；雌花序在下部；總苞片2-3列，連合成2室的橢圓狀總苞體，長約1.5cm，灰褐色或黃褐色，表面生多數鉤刺及短毛，頂端有1-2個嘴刺，內含1-2瘦果。瘦果內含1粒種子。
生長習性：野生於溝旁、路邊、草地及村旁等處，台灣中部的海邊很多。
利用部位：以帶總苞的果實和全草入藥。
主要成分：果實含蒼耳甘(xanthostrumarin)約1.27%、蒼耳醇(xanthanol，$C_{17}H_{24}O_5$)、異蒼耳醇、蒼耳酯(xanthumin，$C_{17}H_{22}O_5$)。另含脂肪油約39%，油中含有大量亞油酸。此外，尚含有蛋白質約13.83%、生物鹼、維生素C及樹脂等。從蒼耳子脫脂後的水浸劑中提出一種黃白色結晶狀含有葡萄糖及鼠李糖甘樣物質，具有毒性作用。
藥　　效：蒼耳子：感冒頭痛，慢性鼻竇炎，副鼻竇炎，瘧疾，風濕性關節炎。蒼耳草：子宮出血，深部膿腫，痲風，皮膚濕疹。
資料來源：http://www.hulu.com.tw/

黃醃菜

編號：TARI-285

中文科名：菊科
英文科名：Compositae
學　　名：*Youngia japonica*
植物特徵：爲1-2年生草本，全株有軟毛，高約20-60公分，具有乳汁。多爲根生葉，羽狀深裂，裂片深淺不一，莖生葉甚少，通常僅有一至四片小葉子，小型。頭狀花序，黃色，頭狀花序全是由十七至十九朵舌狀的小花所組成、花期長。瘦果扁平，具有8-9條縱溝，頂端冠毛白色，可幫助種子傳播。
生長習性：生於路旁、溪邊、草叢、水溝旁、牆上或牆角等陰涼潮濕處。
利用部位：全草。
主要成分：粗蛋白、粗脂肪等。
藥　　效：清熱解毒，利尿消腫，止痛。主治感冒，咽痛，眼結膜炎，乳癰，牙痛，瘡癤腫毒，毒蛇咬傷，痢疾，肝硬化腹水，急性腎炎，淋濁，血尿，白帶，風濕關節炎，跌打損傷。外用治瘡癤腫毒。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑 (2)

食茱萸(紅刺蔥)

編號：TARI-286

中文科名：芸香科
英文科名：Rutaceae
學　　名：*Zanthoxylum ailanthoides* Sieb. & Zucc
植物特徵：落葉性喬木。樹幹具乳房狀銳刺，幼枝及葉脈皆具銳刺。大型羽狀複葉，基部膨大，小葉對生，卵長橢圓形或長橢圓狀披針形，基部鈍圓形，稍偏斜，先端漸尖或微尖，淺圓鋸齒緣，凹處具透明腺體，背面被灰白色粉霜。花單性，繖房狀圓錐花序，頂生枝端。花小，多數，淡綠色或淡白黃色，具短小梗，基部具小苞片。
生長習性：台灣全境山麓至中海拔地區。
利用部位：根、樹皮。
主要成分：根含dictamnine、skimmianine、nitidine、xanthyletin、laurifolie。木部含flavianate、trilobine、magnoflorine、laurifoline、葉含精油、樹脂及酚類。
藥　　效：根有祛風通絡，活血散瘀，溫中燥濕，消腫止痛，解蛇毒之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(5)

雙面刺

編號：TARI-287

中文科名：芸香科
英文科名：Rutaceae
學　　名：*Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC.
植物特徵：攀緣灌木。枝條上有倒勾刺。葉呈羽狀複葉，橢圓形，它的名字便是因葉中肋兩面都長有暗紫紅色的刺而來，不過有些植株只在葉背面有刺。葉肉有油點。花序總狀，淡黃白色而有清香。果實球形，很小，直徑只有0.5公分左右，成熟時黑色，有麻辣味。
生長習性：生於山坡灌木叢中。
利用部位：根及粗莖、果實、枝葉。
主要成分：根含dictamnine，skimmianine，nitidine，xanthyletin，laurifolie。木部含flavianate，trilobine，magnoflorine，laurifoline，葉含精油、樹脂及酚類。
藥　　效：能消腫解毒、舒經活血止痛，祛風消炎止癢。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈上〉

蔥蘭

編號：TARI-288

中文科名：石蒜科
英文科名：Amaryllidaceae
學　　名：*Zephyranthes* candida Herb.
植物特徵：株高約15-20公分，葉狹線形，地下有鱗莖，植株性狀和同屬的橙花韭蘭極爲相似。夏、秋季自葉叢中抽出花莖，先端著生純白色花，有時帶有一絲淡紅，有6花瓣，幾乎全年均能開花。
生長習性：全境庭園普遍作觀賞栽培，爾見馴化野生。
利用部位：全草。
主要成分：全草含石蒜鹼、多花水仙鹼、網球花定鹼、尼潤鹼等生物鹼。花含芸香甘。
藥　　效：全草平肝、鎮靜、治驚風、癲癇。外用治癰瘡，有毒。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉

大棗

編號：TARI-289

中文名稱：大棗
中文科名：鼠李科
英文科名：Rhamnaceae
學　　名：*Zizyphus jujuba* Mill.
植物特徵：落葉灌木或喬木。枝平滑無刺或有成對刺，直伸或鉤曲。幼枝纖細，略呈之字形彎曲，排列成羽狀。葉互生；葉柄短，葉卵圓形至卵狀披針形，先端鈍，基部稍偏斜，邊緣具細齒。花小，聚繖花序，花著生於葉腋；核果卵形至長圓形，肉質，成熟時深紅色。
生長習性：常見於黃土、沙土及沙灘地區。
利用部位：果實。
主要成分：果實含stephorine、N-nornuciferine、asmilobinem。
藥　　效：味甘，性溫。有補脾和胃、益氣生津、潤心肺、安神、止咳的功能。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(上)

大葉千斤拔

編號：TARI-290

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Moghania philippinensis* (Merr. et Rolfe) Li
植物特徵：主根粗如人指，一枝直下，長達50cm，甚難拔取，故名。高30-50cm，枝條柔軟，幼嫩都及花序有褐色毛。小葉3枚，倒卵狀楔形至橢圓狀長方形，或闊披針形，先端鈍或銳，長5-6cm，闊約1cm。托葉及苞小，常存，托葉乾膜質，披針形，共長尖，長5-6cm。花小，偏於一方。鬆馳之總狀花序，蝶形花冠。苞極小，線形；萼長約5mm，密生絨毛，齒披針形；花冠有喙。莢果圓球形，具2種子，有毛。
生長習性：本省中、南部、蘭嶼山野之直立小灌木。
利用部位：根。
主要成分：含羞草鹼甘、黃酮甘、酚類、氨基酸、含羞草鹼。
藥　　效：可治風濕痛、神經衰弱、失眠，可敷治腫痛及帶狀皰疹等，頗具止痛消腫之效。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑〈上〉

補骨脂

編號：TARI-291

中文科名：豆科
英文科名：Leguminosae
學　　名：*Psoralea corylifolia*
植物特徵：一年生草本，莖直立，枝堅硬，單葉互生，基部圓形或微心形，邊緣有不規則粗齒，兩面有顯著黑色腺點，葉脈及緣處有毛，花萼鐘形，淡黃褐色，花期7-8月，果期9-10月。

生長習性：生於山坡、溪邊、田邊草叢中，各地多有栽培。
利用部位：果實。
主要成分：含有香豆精類化合物、psoralen、isopsoralen、angelicin、psoralidin、corylidin、黃酮類化合物。
藥　　效：有補腎助陽功能、虛寒喘咳、可外用。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(上)

火炭母草

編號：TARI-292

中文科名：蓼科
英文科名：Polygonaeae
學　　名：*Polygonum chinense* Linn.
植物特徵：火炭母爲多年生披散或攀援狀草本，長達1.5公尺；莖下部多分枝。匍地者節處生根，嫩部帶紅色，被疏毛或無毛。單葉互生，紙質，卵形、卵狀長圓形或卵狀三角形，長5-12cm，基部截平或近心形，全緣或有小齒，兩面無毛或下面脈上有毛。秋季開花，白色或淡紅色；無花瓣；雄蕊8；子房上位，柱3，下部合生。瘦果卵形，具3稜，包於宿萼內。
生長習性：常生於田野、林下溪邊、路邊和濕地上。
利用部位：全草與根。
主要成分：含有山奈酚(kaempferol)，槲皮素(quercetin)等。根中還含有氨基酸、糖類。
藥　　效：全草治跌打閃挫、久年傷痛、肝炎、感冒、喉炎、敷腫毒、癰疽、痢疾、腸炎、消化不良、扁桃腺炎、咽喉炎、角膜雲翳、白喉、百日咳、子宮頸炎、黴菌性陰道炎、皮膚炎、濕疹、白帶、乳腺炎、癤腫、毒蛇咬傷。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(1)

排香草

編號：TARI-293

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Agastache rugosa*
植物特徵：一年生或多年生草本。株高40-100cm，莖四稜形，帶紅色或暗紅色，稀被毛或腺體。葉對生，柄長1-4cm，葉片橢圓狀卵形或心形至矩圓狀披針形，長3-10cm，寬1.5-6cm，基部近圓形或心形，先端尖或短漸尖形，不整齊鋸齒緣，上面無毛或微具毛，北面散生透明腺點。花期3-5月。果期7-10月。
生長習性：臺灣中北部自生。
利用部位：枝葉、枝莖、莖葉及根 。
主要成分：全草含揮發油。
藥　　效：藿香有益氣，和中，辟穢，發汗，祛濕，解毒之效。藿香根有清暑，除濕，發表之效。藿香露有正氣，清暑，芳香宣濁之效。
資料來源：原色中藥原植物圖鑑(4)

大薊

編號：TARI-294

中文科名：菊科
英文科名：Compositae.
學　　名：*Cirsium japonicum* DC.，
植物特徵：多年生草本，高30-100cm或更高。根長圓錐形，簇生。莖直立，有細縱紋，基部具白色絲狀毛。基生葉有柄，開花時不凋落，呈蓮座狀，葉片倒披針形或倒卵狀橢圓形，長12-30cm，羽狀深裂，裂片5-6對，長橢圓狀披針形或卵形，邊緣齒狀，齒端有尖刺，上面綠色，疏生絲狀毛，下面灰綠色，脈上有毛；中部葉無柄，基部抱莖，羽狀深裂，邊緣有刺；上部葉漸小。夏季開花，頭狀花序單一或數個生於枝端集成圓錐狀；總苞鐘形，長1.5-2cm，寬2.5-4cm，被蛛絲狀毛；苞片長披針形，多層。花兩性，管狀，紫紅色，裂片5；雄蕊5，花藥頂端有附屬片，基部有尾。瘦果長橢圓形，長約3mm，冠毛羽狀，暗灰色。
生長習性：野生於山坡、路邊、靠海地區等處。
利用部位：全草及根。
主要成分：生物鹼及揮發油。
藥　　效：涼血止血，散瘀消腫。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(下)

虎咬癀

編號：TARI-295

中文科名：唇形科
英文科名：Labiatae
學　　名：*Leucas mollissima* Wall. var. *Chinensis* Bentham
植物特徵：多年生草本，莖近方形，基部橫伏，多分枝，上部斜上，全株被白色毛，葉對生，具短柄，葉片廣卵形或卵形至卵狀披針形，花爲輪繖花序，腋生。瘦果細小，卵狀三稜形，花果期夏、秋間。
生長習性：平野至低海拔山區路旁、農園自生。
利用部位：全草。
主要成分：樹皮含皀甘、鞣質。葉含蛋白質、鞣質、粗脂肪。種子含合歡氨酸。
藥　　效：全草有清熱，解毒之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈3〉

冬葵

編號：TARI-296

中文科名：錦葵科
英文科名：Malvaceae
學　　名：*Malva verticillata* Linn.
植物特徵：二年生草本。全株被星狀毛。莖直立。葉互生，具托葉，葉腎形至近圓形。花叢生葉腋，花小，淡紅色。蒴果扁圓形，熟 時心皮分裂，種子腎形。花期夏、秋間，果期秋、冬間。
生長習性：原產亞熱帶至溫帶地區，山地農園或路旁多見馴化自生。
利用部位：根，花，葉，種子。
主要成分：花、葉均含黏液質。葉含malvalic acid，sterculic acid，單糖、蔗糖、澱粉。花含花青素。種子含脂肪油、揮發性精油、蛋白質。
藥　　效：根有清熱，解毒，利尿，通便之效。枝葉有補肝明目，清熱利尿，滑腸通便之效。種子有利水，下乳之效。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑(3)

月桃(斑葉)

編號：TARI-297

中文科名：薑科
英文科名：Zingiberaceae
學　　名：*Alpinia speciosa* (wendl.) K. Schum
植物特徵：草本，高2-3公尺。單葉，互生，具短葉柄，葉舌2裂，長0.8-1公分，外被棕色毛；葉片長50-70公分，寬8-15公分，披針形，兩端漸尖形，葉緣被毛，下表面中肋被毛。花序爲圓錐花序，長25-30公分，花序軸被毛，花梗1-2公分，通常具2朵花，無苞片；小苞片長約2.5公分，2裂，乳白色，頂端呈粉紅色；花萼長約1.5公分，筒狀，一邊分裂，齒緣；花冠3片，長約2.5公分，背裂片破其他裂片大，粉紅色至白色，邊緣被毛，唇瓣長約3公分，寬約2.5公分，卵形，黃色，自基部至近緣具紅色條紋；花藥頂生，長0.8-1公分，退化雄蕊2枚，長0.6-0.8公分，線形，位雄蕊基部，紅色；花柱長約2.2公分，極纖細；子房球形，被棕色毛。果實(蒴果)具稜、球形，深紅色；頂具宿萼，不規則開裂。種子多數，黑色，具白色膜質假種皮。花期自2月至11月。
生長習性：全台低海拔山區皆有分佈。
利用部位：全草、種子、根。
主要成分：種子爲健胃芳香劑，含精油0.96%。
藥　　效：風寒頭痛、虛冷腹瀉、四肢冷痛不能屈伸，月經疼痛，筋骨酸痛。

千日紅

編號：TARI-298

中文科名：莧科
英文科名：Amaranthaceae
學　　名：*Gomphrena globosa* L
植物特徵：一年生草本，高20～60cm，全株密被白色長毛。莖直立，有分枝，近四稜形，具溝紋，節部膨大，帶紫紅色，密被白色柔毛。單葉對生，葉柄長約1cm，上端葉幾無柄；葉片長圓形至橢圓形，長5-10cm，寬2-4cm，先端鈍或尖，基部楔形，全緣，兩面被白色長柔毛和緣毛。夏季開紫紅色、白色或淡紅色花，頭狀花序球形或長圓形，通常單生於枝頂，有時2-3花序並生，花序直徑約2cm，總苞2枚，葉狀，每花基部有乾膜質卵形苞片1枚，三角狀披針形小苞片2枚，小苞片紫紅色，背稜有顯明細鋸齒，花被片披針形，外面密被白色綿毛，花絲合生成管狀，先端5裂。胞果近球形。
生長習性：原產美洲熱帶。國內各地有栽培。
利用部位：花序或全草。
主要成分：千日紅甘Ⅰ或II的羥芳醯基衍生物、皂?、莧菜紅素、千日紅素及硝酸原?。
藥　　效：止咳平喘，平肝明目。
資料來源：常見中草藥(3)

黃麻

編號：TARI-299

中文科名：田麻科
英文科名：Tiliaceae
學　　名：*Corchorus capsularis* Linn.
植物特徵：一年生草本，莖紫紅色或淡紫紅色。葉互生，葉片卵圓狀披針形或披針形，聚繖花序腋生，花黃色。蒴果球形，表面具縱稜和疣狀突起。
生長習性：臺灣零星栽培或園圃種植。
利用部位：根、葉。
主要成分：葉含黃麻甘、矢車菊素單糖甘、β-穀固醇、麻黃屬醇。
藥　　效：利尿、解熱、治腹瀉、痢疾。
資料來源：原色臺灣藥用植物圖鑑(3)

松葉牡丹

編號：TARI-300

中文科名：馬齒莧科
英文科名：Portulacaceae
學　　名：*Portulaca grandiflora*
植物特徵：一或二年生草本，莖分多枝，除了葉腋之外全體光滑無毛。5葉互生或對生，長橢圓狀、倒卵形或匙形，先端鈍或圓，形狀像馬齒。 6花萼2枚，花瓣5枚，雄蕊7-12，花柱3-5裂。
生長習性：栽培土質以肥沃砂質壤土最佳，排水、日照都需良好。
利用部位：全草。
主要成分：含Try ptanthrin。
藥　　效：葉圓渾多汁，可以做豬飼料。能治皮病，也能消毒消炎。
資料來源：原色台灣藥用植物圖鑑〈2〉